

Bryophytes found so far in the vicinity of Mt Bol. Tha¹, compiled from the available data by Volker Otte

Marchantiopsida

- Aneura pinguis* (L.) Dumort.
- (2; as *Riccardia p.* (L.) Gray)
- Apometzgeria pubescens* (Schrank) Kuwah. (2)
- Barbilophozia hatcheri* (A. Evans) Loeske (2)
- Blepharostoma trichophyllum* (L.) Dumort. (2)
- Cololejeunea calcarea* (Lib.) Schiffn. (5)
- Frullania bolanderi* Aust. (4)
- Frullania dilatata* (L.) Dumort. (2)
- Frullania parvistipula* Steph. (1, 2)
- Frullania tamarisci* (L.) Dumort. (2)
- Jungermannia subulata* A. Evans (2)
- Lepidozia reptans* (L.) Dumort. (2)
- Marchantia polymorpha* L. (2)
- Metzgeria conjugata* Lindb. (2)
- Metzgeria fruticulosa* (Dicks.) A. Evans (2)
- Metzgeria furcata* (L.) Dumort. (2)
- Plagiochila asplenoides* (L.) Dumort. (2)
- Porella arboris-vitae* (With.) Grolle (2)
- Porella platyphylla* (L.) Pfeiff. (2)
- Preissia quadrata* (Scop.) Nees (2)
- Ptilidium pulcherrimum* (Weber) Vain. (2)
- Radula complanata* (L.) Dumort. (2)
- Radula lindenberiana* Gottsche ex C. Hartm. (2)
- Riccardia palmata* (Hedw.) Carruth. (2)
- Scapania aequiloba* (Schwägr.) Dumort. (2)
- Scapania calcicola* (Arnell & J. Perss.) Ingham (2)
- Tritomaria exsecta* (Schmidel) Loeske (2)

Bryopsida

- Abietinella abietina* (Hedw.) M. Fleisch. (2)
- Amblystegium subtile* (Hedw.) Schimp. (1)
- Anomodon attenuatus* (Hedw.) Huebener (2)
- Anomodon longifolius* (Brid.) Hartm. (2)
- Anomodon rugelii* (Müll. Hal.) Keissl. (2)
- Anomodon viticulosus* (Hedw.) Hook. & Taylor (2)
- Atrichum flavisetum* Mitt. (2)
- Aulacomnium turgidum* (Wahlenb.) Schwägr. (2)
- Barbula convoluta* Hedw. (1)
- Barbula crocea* (Brid.) F. Weber & D. Mohr (2)
- Barbula unguiculata* Hedw. (1)
- Bartramia halleriana* Hedw. (1)
- Bartramia ithyphylla* Brid. (2)

- Brachythecium albicans* (Hedw.) Schimp. (1)
- Brachythecium rivulare* Schimp. (1)
- Brachythecium salebrosum* (F. Weber & D. Mohr) Schimp. (1)
- Brachythecium velutinum* (Hedw.) Schimp. (2)
- Bryoerhythrophyllum recurvirostrum* (Hedw.) P. C. Chen (1)
- Bryum argenteum* Hedw. (1, 2)
- Bryum capillare* Hedw. (1)
- Bryum pseudotriquetrum* (Hedw.) P. Gärtn. et al. (1)
- Bryum subelegans* Kindb. (2)
- Buxbaumia viridis* (DC. in Lam. & DC.) Moug. & Nestl. (2)
- Calliergon stramineum* (Brid.) Kindb. (1)
- Camptothecium lutescens* (Hedw.) Schimp. [syn. *Homalothecium l.* (Hedw.) Robins.] (2)
- Campylium halleri* (Hedw.) Lindb. (2)
- Campylium protensum* (Brid.) Kindb. (1)
- Campylium stellatum* (Hedw.) C. E. O. Jensen (1)
- Ceratodon purpureus* (Hedw.) Brid. (1, 2)
- Cirriphyllum cirrosum* (Schwägr. in Schultes) Grout (1)
- Climaciumpendroides* (Hedw.) F. Weber & D. Mohr (1)
- Cratoneuron commutatum* (Hedw.) G. Roth (1)
- Cratoneuron filicinum* (Hedw.) Spruce (1)
- Ctenidium molluscum* (Hedw.) Mitt. (1, 2)
- Cynodontium polycarpum* (Hedw.) Schimp. (1)
- Dichodontium pellucidum* (Hedw.) Schimp. (1)
- Dicranella palustris* (Dicks.) Crundw. ex E. F. Warb. (1)
- Dicranodontium denudatum* (Brid.) E. Britton in Williams (1)
- Dicranum bonjeanii* De Not. (1)
- Dicranum muehlenbeckii* Bruch & Schimp. (1)
- Dicranum scoparium* Hedw. (2)
- Dicranum viride* (Sull. & Lesq.) Lindb. (1)
- Didymodon fallax* (Hedw.) R. H. Zander (1)
- Didymodon rigidulus* Hedw. (1)
- Distichium capillaceum* (Hedw.) Bruch & Schimp. (1)
- Distichium inclinatum* (Hedw.) Bruch & Schimp. (1)
- Districhum flexicaule* (Schwägr.) Hampe (1, 2)
- Encalypta streptocarpa* Hedw. (1)

¹ For a map of the study area see Fig. 2 on page 87 in this volume

- Encalypta vulgaris* Hedw. (1, 2)
Entodon concinnus (De Not.) Paris (1, 2)
Entodon schleicheri (Schimp.) Demet. (1)
Euryhynchium angustirete (Broth.) T. J. Kop. (2)
Euryhynchium hians (Hedw.) Sande Lac. (1)
Euryhynchium striatum (Hedw.) Schimp. (1)
Fissidens dubius P. Beauv. (2)
Fissidens gracilifolius
 Bruggemann-Nannenga & Nyh. (1)
Fissidens osmundooides Hedw. (2)
Fissidens taxifolius Hedw. (2)
Funaria hygrometrica Hedw. (1)
Grimmia affinis Hoppe & Hornsch.
 ex Hornsch. (2)
Gymnostomum aeruginosum Sm. (1)
Gyroweisia tenuis (Hedw.) Schimp. (1)
Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv. (1)
 – var. *leucophaea* Bruch & Schimp. (2)
Herzogiella seligeri (Brid.) Z. Iwats. (2)
Homalia besseri Lobarz. (1, 2)
Homalia trichomanoides (Hedw.) Schimp. (2)
Homalothecium philipeanum
 (Spruce) Schimp. (1, 2)
Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp. (1)
Hygroamblystegium tenax (Hedw.) Jenn. (1)
Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. (1, 2)
Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. (2)
Hypnum cupressiforme Hedw. (1)
 – var. *filiforme* Brid. (1)
Hypnum vaucherii Lesq. (1)
Isopteriopsis pulchella (Hedw.) Z. Iwats. (1)
Isothecium alopecuroides (Dubois) Isov. (2)
Leskeella nervosa (Brid.) Loeske (2)
Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr. (1)
Leucodon immersus Lindb. (3)
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. (1, 2)
Meesia uliginosa Hedw. (1)
Mnium ambiguum H. Müll. (1)
Mnium marginatum (Dicks.) P. Beauv. (1, 2)
Mnium spinulosum Bruch & Schimp. (2)
Mnium stellare Hedw. (1)
Molendoa sendtneriana
 (Bruch & Schimp.) Limpr. (1)
Myurella julacea (Schwägr.) Schimp. (1)
Neckera complanata (Hedw.) Huebener (2)
Neckera crispa Hedw. (2)
Neckera pennata Hedw. (2)
Neckera pumila Hedw. (2)
Oncophorus virens (Hedw.) Brid. (1)
Orthodicranum flagellare (Hedw.) Loeske (1)
Orthodicranum montanum (Hedw.) Loeske (1)
- Orthotrichum anomalum* Hedw. (1)
Orthotrichum cupulatum Brid. (2)
Orthothecium intricatum (Hartm.) Schimp. (1)
Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor (1)
Orthotrichum obtusifolium Brid. (1)
Orthotrichum pallens Bruch ex Brid. (1)
Orthothecium rufescens (Brid.) Schimp. (1)
Orthotrichum rupestre Schleich. ex Schwägr. (2)
Orthotrichum sordidum Sull. & Lesq. (1)
Orthotrichum speciosum Nees in Sturm (2)
Orthotrichum stramineum Hornsch. ex Brid. (2)
Orthotrichum striatum Hedw. (2)
Orthotrichum vladikavkanum Vent. (3)
Palamocladium euchloron
 (Müll. Hal.) Wijk & Marg. (1)
Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra (1)
Palustriella decipiens (De Not.) Ochyra (1)
Paraleucobryum longifolium
 (Hedw.) Loeske (1, 2)
Philonotis fontana (Hedw.) Brid. (1)
Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T. J. Kop. (2)
Plagiomnium ellipticum (Brid.) T. J. Kop. (1)
Plagiomnium rostratum (Schrad.) T. J. Kop. (1)
Plagiomnium undulatum (Hedw.) T. J. Kop. (1)
Plagiopus oederianus
 (Sw.) H. A. Crum & L. E. Anderson (1, 2)
Plagiothecium denticulatum
 (Hedw.) Schimp. (1, 2)
Plagiothecium laetum Schimp. (1)
Plagiothecium nemorale (Mitt.) A. Jaeger
 [incl. *P. succulentum* (Wilson) Lindb.] (1, 2)
Platydictya jungermannioides
 (Brid.) H. A. Crum (1)
Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb. (1)
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. (1)
Pogonatum aloides (Hedw.) P. Beauv. (2)
Pogonatum urnigerum (Hedw.) P. Beauv. (2)
Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. (1, 2)
Pohlia wahlenbergii
 (F. Weber & D. Mohr) A. L. Andrews (1)
Polytrichastrum alpinum
 (Hedw.) G. L. Sm. (1, 2)
Polytrichum formosum Hedw. (1, 2)
Polytrichum juniperinum Hedw. (1)
Polytrichum sexangulare Brid. (1, 2)
Pseudoleskeella catenulata (Schrad.) Kindb. (1)
Pterigynandrum filiforme Hedw. (2)
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. (2)
Ptychodium plicatum (F. Weber & D. Mohr.)
 Schimp. (1)
Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp. (1, 2)

- Racomitrium canescens* (Hedw.) Brid. (2)
Rhizomnium pseudopunctatum
(Bruch. & Schimp.) T. J. Kop. (1)
Rhizomnium punctatum (Hedw.) T. J. Kop. (2)
Rhynchosstegium murale (Hedw.) Schimp. (1)
Rhynchosstegium ripariooides
(Hedw.) Cardot (1, 2)
Rhytidadelphus triquetrus
(Hedw.) Warnst. (1, 2)
Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. (2)
Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske (2)
Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch &
Schimper s. l. (1, 2)
Seligeria donniana (Sm.) Müll. Hal. (2)
Seligeria pusilla (Hedw.) Bruch & Schimp. (3)
Sphagnum subsecundum Nees (1)
Tetraphis pellucida Hedw. (2)
Thamnobryum alopecurum
(Hedw.) Gangulee (1, 2)
- Thuidium delicatulum* (Hedw.) Mitt. (1)
Thuidium philibertii Limpr. (1, 2)
Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb. (2)
Timmia austriaca Hedw. (1, 2)
Timmia megapolitana Hedw. var. *bavarica*
(Hessl.) Brid. (1)
Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. (2)
Tortula mucronifolia Schwägr. (1)
Tortula norvegica
(F. Weber) Wahlenb. ex Lindb. (1, 2)
Tortula subulata Hedw. (2)
Trichostomum crispulum Bruch (1)
Ulota coarctata (P. Beauv.) Hammar (3)
Ulota crispa (Hedw.) Brid. (2)
Weissia controversa Hedw. (2)
Zygodon rupestris Schimp. ex Lorentz (2)

Data sources

- (1) AKATOVA, T. V. & V. OTTE (2007) in this volume: (as far as not mentioned in (2) or with additional stands here)
- (2) OTTE, V. (2001): Flechten und Moose im Gebiet des Bolschoi Tchatsch (NW-Kaukasus) – eine erste Übersicht, ergänzt durch einige von D. Benkert bestimmte Pezizales. – Feddes Repert. **112**: 565 – 582
- (3) OTTE, V. (2004): Flechten, Moose und lichenicole Pilze aus dem nordwestlichen Kaukasus – erster Nachtrag. – Feddes Repertorium **115** (1 – 2): 155 – 163
- (4) OTTE, V. (2006): Erster Nachweis von *Frullania bolanderi* (Marchantiophyta: Jubulaceae) im Kaukasus. – Herzogia **19**: 353 – 355
- (5) OTTE, V (ined.: Herb. Otte or GLM)