

# ABHANDLUNGEN UND BERICHTE DES NATURKUNDEMUSEUMS GÖRLITZ

Band 38

Leipzig 1963

Nr. 13

## Beiträge zur Pilzflora der Niederlausitz II

Von WOLFGANG FISCHER

Institut für Landesforschung und Naturschutz, Zweigstelle Potsdam

(Leiter: Dr. K. H. Großer)

Die vorliegende Arbeit enthält mykologische Beobachtungen aus der Niederlausitz, die vom Verfasser im Rahmen vegetationskundlicher Gelandearbeiten im Jahre 1961 gemacht wurden. Sie setzt die Reihe der mykologischen Notizen des 1. Beitrages zur Pilzflora der Niederlausitz (Abh. u. Ber. Naturkundemus. Görlitz, Band 37, H. 2, S. 223–234) fort. Der größte Teil der bemerkenswerten Fundorte liegt wiederum im Luckauer Becken. Allgemein gehaltene Angaben beziehen sich auf dieses Gebiet. Darüber hinaus liegen Beobachtungen aus den angrenzenden Teilen der Niederlausitz von Golßen, Lübben, Lübbenau, Vetschau und Calau vor.

Von A. ARNDT (A) wurden weitere in seinem Nachlaß gefundene mykologische Aufzeichnungen aufgenommen. Von Herrn Dr. K. H. MARSCHALLEK (M) erhielt der Verfasser eine Anzahl wertvoller Fundortangaben aus der Gegend von Rietzneuendorf (nordöstlich Golßen), Lübben und Lubsko (Sommerfeld), die ebenfalls Berücksichtigung fanden. Für die Bestimmung einiger Arten aus der Ordnung *Poriales* möchte der Verfasser Herrn Dr. H. KREISEL, Greifswald, und Herrn W. DAHNKE, Parchim, an dieser Stelle seinen besonderen Dank aussprechen.

### Ascobolaceae

*Ascobolus stercorarius* Bull. — Reichwalde: Kurze Heide (A, ohne Datum).

### Pezizaceae

*Lachnea hemisphaerica* Wigg. — Zerstreut auf feuchtem Waldboden.

*L. scutellata* L. — Vetschau: Mühlenfließ bei Görzitz (12. 9. 61).

*Flicaria violacea* Pers. — Luckau: Brandstelle am Buschteich bei Weissack, mit *Pholiota carbonaria* (27. 7. 61).

*Humaria rutilans* Fr. — Drehna am Sandteich, zahlreich auf feuchtem Sand in der Nähe des Ufers (17. 6. 61).

#### Rhizinaceae

*Rhizina inflata* Schaeff. — Rochauer Heide, zahlreich auf Brandplätzen südlich Neusorgefeld (13. 9. 61); Dornswalde, trockene Heide (M, 26. 6. 49).

#### Geoglossaceae

*Mitula paludosa* Fr. — Luckau: Sandteich bei Drehna im nassen Kiefern-Birken-Bruch, auf Kiefernadeln (27. 6. 61); Bergener Moor in einem Abzugsgraben (Juni 1961).

#### Helvellaceae

*Gyromitra esculenta* Pers. — Nördlich Bergen im trockenen Kiefernwald, Jagen 127 (18. 3. 61); Höllenberge bei Langengrassau mehrfach (18. 4. 61).

*Morchella hybrida* Sow. — Senftenberg: Zwischen Almosen und Lindchen an der Chaussee (KRAUSCH, Mai 1960).

*Verpa conica* Mill. — Golßen: Zützener Busch, ein Exemplar im feuchten Eichen-Hainbuchenwald am Weg (KRAUSCH u. FISCHER, 18. 4. 61).

*Helvella lacunosa* Afz. — Am Sandteich bei Drehna, zahlreich und z. T. in Zwergexemplaren (27. 6. 61).

#### Auriculariaceae

*Auricularia mesenterica* Dicks. — Sonnewalde: Im Park und im Tiergarten zwischen Forsthaus Brehnitz und Zickerin, zahlreich an Ulmenstümpfen (16. 5. 61).

#### Tremellaceae

*Sebacina incrustans* (Pers.) Tul. — Sonnewalde: Im Tiergarten am Forsthaus Brehnitz (16. 5. 61); Luckau: Gehrener Quellen, Rasen von *Fegatella conica* dicht überziehend (Okt. 1961).

*Exidia glandulosa* Fr. — Luckau: Park von Görzsdorf, an einem Stamm von *Prunus padus* (20. 4. 61).

*E. saccharina* Fr. — Reichwalde: Kiefernstock in der Kurzen Heide (A, 26. 12. 32).

*Tremellodon gelatinosum* (Scop.) Fr. — Golßen: Alt-Buchhorst (A, 1925).

### Exobasiadeae

*Exobasidium vaccinii* (Fuck.) Woronin — Häufig im Kiefernwald zwischen Weissack und Bergen an *Vaccinium vitis-idaea* (1961).

### Bondarzewiaceae

*Hericium ramosum* (Bull. ex Merat) Letellier (= *Dryodon coralloides* Scop.) — Golßen: Rietzneuendorf, Staatsforst, an einer morschen Buche in 5 m Höhe, Riesenexemplar von ca. 2,5 kg (M, 5. 9. 1946).

### Clavariaceae

*Sparassis crispa* (Wulf. ex Fr.) Fr. — Ziemlich häufig in Kiefernwäldern, z. B. bei Walddrehna und in der Kurzen Heide bei Kreblitz (1961).

*Clavaria argillacea* Pers. — Reichwalde: Kurze Heide, gesellig zwischen Heidekraut (A).

*Ramaria invalii* Cott. et Wakef. — Luckau: Schlagteich bei Bornsdorf, im Kiefern-Birken-Bestand einen Hexenring bildend (26. 7. 61); Calau: Kiefernwald südwestlich Koßwig (14. 9. 61).

*R. cristata* (Holmsk.) Ricken — Luckau: Nordufer vom Großen Teich bei Wanninchen, zahlreich unter Roteichen (27. 7. 61).

*R. pyxidata* Fr. — Luckau: Bergener Moor, besonders am Nordrand, mehrfach an Kiefernstümpfen (28. 7. 61); Reichwalde: An einem Kiefernstock in der Kurzen Heide (A, 21. 7. 54).

### Coniophoraceae

*Peniophora incarnata* (Pers.) Cooke — Reichwalde: An der Berste an trockenen Ästen (25. 3. 61).

### Fistulinaceae

*Fistulina hepatica* Schaeff. ex Fr. — Rietzneuendorf: Öfter an Eichenstämmen (M).

### Ganodermataceae

*Ganoderma applanatum* (Pers.) Pat. — Häufig im Gebiet, z. B. bei Reichwalde in Mengen an Pappelstümpfen an der Berste; Weissacker Park an einem Lindenstumpf; Golßen: Wald am Gehege bes. an Eschenstümpfen; Am Schlagteich bei Bornsdorf an einem Eichenstumpf (1961).

*G. lucidum* (Leyss.) Karst. — Reichwalde: Kaseler Busch (A, 1919); Golßen: Laubwald Jagen 435, am Laubholzstumpf (M, 24. 7. 48); Waldow: An Eiche (M, 22. 6. 49); Luckau: Weissacker Park am Buschteich, ein gestieltes Exemplar an einem morschen Eichenstumpf (19. 4. 61).

## Hydnaceae

*Sarcodon subsquamosum* Batsch — Lubsko (Sommerfeld): Kotsemke, Kiefernheide (M, Sept. 1936).

*Calodon suaveolens* Scop. — Freiwalde (A, 1. 10. 32).

*C. nigrum* (Fr.) Quél. — Luckau: Drehna, Roteichenbestand bei der Teichanlage am Weg zum Forsthaus Weinberg (16. 9. 61).

*Hydnum fragile* Fries — Reichwalde: Alt-Buchhorst, einen Ring bildend (A, 3. 9. 22).

*Pleurodon auriscalpium* (L.) Fr. — Luckau: Schlagteich bei Bornsdorf vereinzelt (26. 7. 61).

## Hymenochaetaceae

*Hymenochaete rubiginosa* (Dicks. ex Fr.) Lev. — Golßen: Zützener Busch, Eichenstumpf im feuchten Hainbuchen-Wald (18. 4. 61); Sonnewalde: Eichenstumpf im Tiergarten nahe Forsthaus Brehnitz (16. 5. 61).

*Inonotus cuticularis* (Bull. ex Fr.) P. Karsten — Luckau: Weissacker Park, mehrere Exemplare an einem Buchenstumpf und an einem Buchenstamm 3 m hoch (27. 7. 61).

*I. hispidus* (Bull. ex Fr.) P. Karsten — Luckau: Mehrfach an Apfelbäumen in der Calauer Vorstadt an der Chaussee nach Schlabendorf und bei den Scheunen (28. 7. 61); Calau: An der Straße nach Saßleben, an einem Apfelbaum (13. 9. 61); Vetschau: Apfelbaum an der Straße nach Duben (13. 9. 61).

*I. obliquus* (Pers.) Pilat — Luckau: Höllenberge bei Langengrassau an einer Birke (16. 5. 61).

*I. radiatus* (Sow. ex Fr.) P. Karsten — Im Gebiet ziemlich häufig, stets an Erlen, so besonders an der Berste bei Reichwalde, im Kaseler Busch, Gehrener Quellen bei Neu-Mühle (1961); verbreitet im Oberspreewald, so bei Lehde und Lübbenau (1961).

*Phaeolus schweinitzii* (Fr.) Pat. — Reichwalde: Kurze Heide (A, ohne Datum); Langengrassau, Schafteich am Nordfuß der Höllenberge an einem Fichtenstumpf (Sept. 1961).

*Phellinus pini* (Thore ex Fr.) Pilat — Luckau: Bergener Moor nordwestl. Bergen, im Kiefern-Moorwald (1961); Lübben: Kiefernwald am Briesener See (Juni 1961).

*P. pomaceus* (Pers.) Maire — Lübben: Duben, zahlreich an abgestorbenen Pflaumenbäumen an der Straße nach Luckau (1961); Luckau: In Gärten an *Prunus domestica* mehrfach (Juli 1961).

- P. ribis* (Schum. ex Fr.) Quél. — Reichwalde, an *Ribes rubrum* (12. 9. 61); Luckau: Park in Görldorf, an *Ribes alpinum* (20. 4. 61); Luckau: In Gärten an *Ribes grossularia* und *R. rubrum* mehrfach (Juli 1961).
- P. robustus* (P. Karsten) Bourd. & Galzin — Wiesenburger Park an Eichen (1961); Sandteich bei Drehna an Eichen (1961); Luckau: Wanninchener Mühle und am Gr. Teich bei Wanninchen an Eichen (1961); Park in Zinnitz zahlreich an alten Eichen (1961); Park in Weissack mehrere Fruchtkörper an einer Robinie (1961).
- P. trivialis* (Bres.) Kreisel — Ziemlich häufig an Weiden, so besonders an der Studenitz bei Willmersdorf, im Frankendorfer Moor und in Terpt (1961); verbreitet im Oberspreewald zwischen Lübben und Lübbenau und bei Altzauche (1961).

#### Poriaceae

- Fomes fomentarius* (L. ex Fr.) Kickx. — Luckau: Zahlreich an *Betula verrucosa* und *B. pubescens* im Moorwald am Gr. Teich bei Wanninchen (1961); Golßen: Wald am Gehege viel an *B. pubescens* (1961).
- Gloeophyllum abietinum* (Bull. ex Fr.) P. Karsten — Wiesenburger Park, Fichtenstümpfe (1961).
- G. sepiarium* (Wulf. ex Fr.) P. Karsten — Luckau: Fichtenstümpfe im Park von Weissack (19. 4. 61), im Park von Görldorf (20. 4. 61) und im Park von Drehna (20. 4. 61).
- Meripilus giganteus* (Pers. ex Fr.) P. Karsten — Reichwalde: Kaseler Busch an Ulme (A, 1944).
- Hapalopilus nidulans* (Fr.) P. Karsten — Lübbenau: An Birkenstangenholz nahe der Straße zwischen Gr. Lübbenau und Bischdorf, im Eichen-Birken-Wald (14. 9. 61); Luckau: An abgefallenen Ästen der Roteiche am Gr. Teich bei Wanninchen und am Sandteich bei Drehna (Juli 1961).
- Laetiporus sulphureus* Bull. — Im Gebiet nicht selten, so an Eichenstümpfen im Park von Weissack, am Gr. Teich bei Wanninchen und an den Reptener Teichen (1961); Golßen: Eichenstumpf im Laubwald nördlich der Stadt (1961); im Spreewald zwischen Lehde und Lübbenau an *Salix alba* in 6 m Höhe (10. 6. 61).
- Osmoporus odoratus* (Wulfen ex Fr.) Singer — Luckau: Fichtenstümpfe im Park von Weissack zahlreich, ferner am Ziegelteich im Park von Drehna (1961); Sonnewalde: Im Tiergarten nicht selten an Fichtenstümpfen (1961).
- Poria versipora* (Pers.) Baxter — Häufig an trockenen, abgefallenen Ästen verschiedener Laubgehölze.

*Pycnoporus cinnabarinus* (Jacq. ex Fr.) Fr.— Luckau: Bergen am Weg zum Forsthaus Weinberg zahlreich an Espenholz (19. 5. 61); Lübben: Am Südufer vom Briesen-See, an einem Birkenstumpf (Juni 1961).

*Gloeoporus amorphus* (Fr.) Clem. et Shear — Ziemlich häufig an Kiefernstümpfen.

*Trametes betulina* (L. ex Fr.) Pilat — Reichwalde: Kaseler Busch, zahlreich an einem Eichenstumpf (25. 3. 61); Sonnewalde: An Eichenkoppelpfählen an der Straße nach Zickerin (12. 6. 61).

*T. hirsuta* (Wulfen ex Fr.) Pilat — Lübben: Am Briesener See (11. 6. 61); Luckau: Östlich Gehren an der Chaussee, an Kirschbaumholz (15. 9. 61).

*T. mollis* (Sommerf.) Fr. — Nördlich Reichwalde an der Berste, an abgefallenen Ästen (25. 3. 61) (det. KREISEL). In Deutschland sehr seltene, montane Art, die bisher in Brandenburg nicht beobachtet wurde.

*T. suaveolens* (L. ex Fr.) Fr. — Reichwalde: Nördlich des Dorfes, an Weiden und Schwarzpappeln (15. 3. 61), im Herrenbusch an Weiden (A); Luckau: Bornsdorf am Ufer des Schlagteiches, mehrfach an Weiden (Juli 1962).

*T. serialis* Fr. — Sonnewalde: Tiergarten am Forsthaus Brehnitz, an Fichtenstümpfen (April 1961).

*Tyromyces fissilis* (Berk. & Curt.) Donk. — Lübben: An einem Apfelbaum am Wall (14. 9. 61).

#### Stereaceae

*Stereum purpureum* (Pers. ex Fr.) Fr. — Luckau: Birkenstümpfe südlich Bornsdorf (19. 4. 61).

*S. rugosum* (Pers. ex Fr.) Fr. — Luckau: Gahroer Buchheide, an Hainbuchen (19. 4. 61); Park in Drehna am Ziegelteich, an Erlen (27. 7. 61); Park in Zinnitz an Hainbuchen (Juli 1961).

*S. sanguinolentum* (Alb. & Schw. ex Fr.) Fr. — Park in Zinnitz, an Fichtenstümpfen (Juli 1961).

#### Polyporaceae

*Folyporus squamosus* (Huds. ex Fr.) Fr. — Im Gebiet verbreitet, besonders an Weichhölzern. Sonnewalde: Ulmenstümpfe im Tiergarten mehrfach (April 1961); Luckau: Stadtgraben am Turm, an Apfelbaum und Eschenahorn (14. 9. 61); in Walddrehna an Roßkastanie (Sept. 1961).

*P. arcularius* Batsch ex Fr. — Luckau: Park in Görlsdorf, an einem morschen Eichenstumpf (20. 4. 61).

- P. brumalis* Pers. ex Fr. — Im Gebiet verbreitet an abgefallenen Ästen und an Laubholzstümpfen und -stubben.
- P. confluens* (A. et Schw.) Fr. — Lübben: Staakow, sandige Heide (M., 17. 9. 50); Reichwalde: Hammelstall (A, 1915).
- P. ovinus* (Schaeff.) Fr. — Luckau: Wehnsdorf, häufig truppweise im trockenen Kiefernwald (M, 8. 9. 46); Reichwalde: Kurze Heide (A, ohne Datum).
- P. leucomelas* (Pers.) Fr. — Lübben: Staakow und Dornswalde, trockene Kiefernheide (17. 9. 50).

#### Boletaceae

- Boletus appendiculatus* Schaeff. — Luckau: Am Forsthaus Weinberg, im Buchenwald 3 Exemplare (15. 9. 61). In Brandenburg sehr selten beobachtet, so in dem Tegeler Forst (Berlin) (STRAUS, 1959).
- B. satanas* Lenz. — Reichwalde (A, 1915). In Brandenburg ist der Satanspilz bisher nur aus der Triglitzer Gegend in der Prignitz (JAAP, 1922) bekannt. Ein weiteres fragwürdiges Vorkommen erwähnt ULBRICH (1937) von Frankfurt/Oder.
- B. luridus* Fr. — Fichtenau (A, 1915); Luckau: Am Gr. Teich bei Wanninchen (Juli 1961); Wehnsdorf, im trockenen Kiefernwald (M, 7. 9. 46).
- Suillus piperatus* (Bull. ex Fr.) Kuntze — Reichwalde: Kurze Heide (1961).
- Xerocomus parasiticus* (Bull. ex Fr.) Quél. — Lubsko (Sommerfeld): Kotsemke am Forsthaus, im feuchten Kiefern-Birken-Wald, alljährlich erscheinend Ende Juli/August (M).

#### Paxillaceae

- Paxillus atrotomentosus* (Batsch) Fr. — Häufig, aber meist einzeln, an Kiefernstümpfen, in Wald- und Forstgesellschaften.
- P. panuoides* Fr. — Luckau: Kiefernstümpfe im Bergener Moor (1961).

#### Gomphidiaceae

- Gomphidium glutinosus* (Schaeff.) Fr. — Lübben: Rietzneuendorf, im Garten unter Spitzpappeln (M).
- G. roseus* (L.) Fr. — Lübben: Rietzneuendorf, Nadelwald (M, 1948).

#### Hygrophoraceae

- Hygrocybe cantharellus* (Schw.) Lge. — Luckau: Bergener Moor, Torfstich II, im Schwingrasen von *Sphagnum medium* (1961).
- H. miniata* (Scop. ex Fr.) Karsten — Golßen: Freidorf, zwischen Gras und hohen Wiesen (M, 17. 9. 61).

*Hygrophorus hypotheius* Fr. — Zerstreut in Kiefernwäldern, vor allem im Spätherbst nach Frühfrösten auftretend.

*H. eburneus* (Bull.) Fr. — Golßen: Freidorf, an der Försterei Semmelei (M, 17. 9. 50).

#### Tricholomataceae

*Lyophyllum aggregatum* (Schaeff. ex Fr.) Kühn. — Luckau: Bei den Scheunen auf den Druschabfällen zahlreich (28. 7. 61).

*Clitocybe brumalis* (Fr.) Quél. — Reichwalde: Kurze Heide, im Kiefernwald (Sept. 1961).

*C. metachroa* (Fr.) Quél. — Reichwalde: Kurze Heide (A).

*Collybia cirrhata* (Schum. ex Fr.) Quél. — Luckau: Nördlich Pademack im Kiefernwald (Sept. 1961).

*C. confluens* (Pers. ex Fr.) Quél. — Luckau: Weissacker Park zahlreich (Juli 1961).

*C. maculata* (A. et Schw. ex Fr.) Quél. — Ragow, feuchte Kiefernheide (M, 1937); Lübbenauer Heide nördlich Calau mehrfach (Sept. 1961).

*Tricholoma albobrunneum* (Fr.) Quél. — Alt-Buchhorst (A, 17. 9. 22).

*T. colossum* (Fr.) Quél. — Kotsemke bei Lubsko (Sommerfeld), trockene Kiefernheide (M, Sept. 1936 u. 1937).

*T. luridum* Schaeff. — Golßen: Freiwalde (A, 14. 10. 18).

*T. flavobrunneum* (Fr.) Quél. — Im Gebiet nicht selten, charakteristisch für Kiefern-Birken-Bestände auf frischen Rohhumusböden, so z. B. Luckau: Bei den Bornsdorfer Teichen; Lübbenauer Heide nördlich Calau; Vetschau: Wald zwischen Boblitz u. Raddusch; Vetschau: Bei Göritz am Mühlenfließ (1961).

*T. flavovirens* (Pers. ex Fr.) Lund. — Rochauer Heide bei Neusorgefeld (Sept. 1961).

*Phyllotopsis nidulans* (Pers. ex Fr.) Quél. — Reichwalde: An einem Kiefernstock in der Kurzen Heide (A, 26. 10. 52).

*Panus conchatus* (Bull.) Fr. — Luckau: Groß-Krausnick am Weg nach Wehnsdorf, an einem Birkenstumpf (Sept. 1961).

*P. tigrinus* (Bull. ex Fr.) Sing. — Luckau: An der Chaussee nach Duben an Apfelbäumen mehrfach (28. 7. 61).

*Lentinus lepideus* Fr. — Golßen: Rietzneuendorf, an Kiefer (M, 9. 6. 48); Lübben: Altzauche im Umflutkanal, an einem Schleusentor (10. 6. 61); Drehnaer Park, Fichtenstümpfe am Ziegelteich (Juni 1961); Park von Weissack, Kiefernstumpf (26. 7. 61).

*Schizophyllum commune* Fr. — Im Gebiet ziemlich verbreitet, so bei Reichwalde an der Berste massenhaft an gefällten Erlenstämmen (25. 3. 61); Bergener Moor und Görtsdorfer Park an Erlenholz (April 1961); Weissacker Park an Buchenholz (27. 7. 61); Lübben: Nördlich Tornow an Eichenholz, im Eichen-Birken-Wald (15. 9. 61); zwischen Calau und Saßleben an Eichenästen (14. 9. 61).

*Oudemansiella platyphylla* (Pers. ex Fr.) Mos. — Sonnewalde: Tiergarten, an einem Buchenstumpf (1961).

*O. radicata* (Relh. ex Fr.) Bours. — Weissacker Park (Juli 1961).

*Pseudohiatula conigena* (Pers. ex Fr.) — Zerstreut in den Kiefernwäldern, Höllenberge bei Langengrassau mehrfach; Bergener Moor; Wald nördlich Bergen; Gr. Teich bei Wanninchen; Pademacker Teich (April 1961).

*P. tenacella* (Pers. ex Fr.) — Luckau: Kiefernwald nördlich Bergen (März 1961).

*Baeospora myosura* (Fr.) Sing. — Luckau: Pademack am Weg nach Zinnitz, im Kiefernwald (15. 9. 61).

*Marasmius perforans* (Hofm. ex Fr.) Sing. — Höllenberge bei Langengrassau, auf Fichtennadeln (Juli 1961).

*M. rotula* (Scop. ex Fr.) Fr. — Reichwalde, Busch (A, 1916).

*M. peronatus* (Bolt. ex Fr.) Sing. — Luckau: Im Park von Drehna, unter Fichten (Juli 1961).

*Mycena pura* (Pers. ex Fr.) Quél. — Luckau: Buchenwald am Drehnaer Sandteich; Weissacker Park (Juli 1961).

*M. sanguinolenta* (A. et Schw. ex Fr.) Quél. — Luckau: Am Schlagteich bei Bornsdorf (26. 7. 61).

*M. olida* Bres. — Luckau: Park in Drehna, an einem Laubholzstumpf (27. 7. 61).

#### Amanitaceae

*Volvariella speciosa* (Fr.) Sing. — Luckau: An den Scheunen, auf Druschabfällen mit *Agaricus hortensis* und *Lyophyllum aggregatum* (28. 7. 61).

*V. bombycina* (Pers. ex Fr.) Sing. — Golßen: Rietzneuendorf, feuchter Laubwald, schönes, großes Exemplar im Astloch einer Pappel (M, 1946); Luckau: Pademack am südlichen Dorfausgang, im hohlen Stumpf von *Acer platanoides* (29. 6. 61).

*Amanita phalloides* (Vaill. ex Fr.) Secr. — Luckau: Nördlich Groß-Krausnick am Weg nach Wehnsdorf, im Eichen-Birken-Wald (15. 9. 61); Weissacker Park, unter Eichen am Schloß (27. 7. 61).

*A. porphyrea* (A. et Schw. ex Fr.) Secr. — Staakow, sandige Heide (M, 17. 9. 50); Lübbenauer Heide 2 km nördlich Calau (14. 9. 61).

#### Agaricaceae

*Lepioto naucina* Fr. (non auct.) — Golßen: Waldow (M, 22. 6. 49).

*L. serena* (Fr.) Sacc. — Golßen: Rietzneuendorf, im trockenen Grase (M, 3. 9. 50).

*Agaricus silvicolus* (Vitt.) Sacc. — Calau: Am Seesenteich in der Lübbenauer Heide (14. 9. 61).

*A. cretaceus* Fr. — Lübben: Steinkirchen, am Spreedeich südlich des Dorfes massenhaft (M, 31. 8. 37).

*A. bisporus* (Lge.) Sing. — Luckau: An den Scheunen, auf Druschabfällen massenhaft (28. 7. 61).

#### Cortinariaceae

*Rozites caperata* (Pers. ex Fr.) Karsten — Rochauer Heide bei Neusorgefeld (Sept. 1961); Kotsemke bei Lubsko (Sommerfeld), trockene Kiefernheide (M, 3. 10. 37).

*Galerina hypnorum* (Schrank ex Fr.) Kühn. — Ziemlich häufig in frischen Kiefernwäldern, meist im Rasen von *Pleurozium schreberi*.

*Gymnopilus spectabilis* (Fr.) Sing. — Lübbenauer Heide nördlich Calau (14. 9. 61); Luckau: Nördlich Tornow, an einem Eichenstumpf (15. 9. 61).

*G. sphagnorum* (Pers. ex Fr.) Kühn. — Luckau: Bergener Moor, im Rasen von *Sphagnum medium* (Juli 1961).

*Myxaciium delibutum* (Fr.) Ricken — Kotsemke bei Lubsko (Sommerfeld), trockene Heide (M, 1937).

*M. vibratile* (Fr.) Ricken — Staakow (M, 17. 9. 50).

*Phlegmacium orichalceum* (Batsch) Fr. — Golßen: Rietze, Staatsforst unter Eichen (M, 8. 10. 50).

#### Crepidotaceae

*Crepidotus variabilis* (Pers. ex Fr.) Quél. — Lübben: Kiefernwald östlich Terpt, an trockenen Ästen (15. 9. 61).

#### Strophariaceae

*Pholiota subsquarrosa* Fr. — Golßen: Rietze, Staatsforst an lebender Buche (M, 9. 10. 50).

*P. squarrosa* Müll. — Golßen: Staatsforst, an Wurzeln einer Esche (M, 1943); Reichwalde: Kaseler Busch (18. 10. 36).

*Naematoloma capnoides* (Fr.) Karsten — Großkrausnicker Heide, an Kiefernstümpfen (15. 9. 61).

*N. sublateritium* (Fr.) Karsten — Lübbenauer Heide nördlich Calau; Großkrausnicker Heide (Sept. 1961).

#### Bolbitiaceae

*Bolbitius vitellinus* (Pers.) Fr. var. *titubans* (Bull. ex Fr.) — Reichwalde, an Kuhfladen (20. 10. 37).

*Agrocybe praecox* (Pers.) Fay. — Luckau: Südlich Bergen, im Junco-Molinietum (März 1961).

#### Coprinaceae

*Panaeolus campanulatus* (L.) Fr. — Ziemlich häufig auf Dungplätzen, in Wäldern und auf Weiden.

*Psathyrella Candolleana* (Fr.) — Reichwalde, in Gärten; Luckau am Stadtgraben (Sept. 1961); Lübben: Baumstumpf in Lehde (10. 6. 61).

*P. velutina* (Pers. ex Fr.) Sing. — Luckau: Weissacker Park (27. 7. 61).

*Coprinus micaceus* (Bull. ex Fr.) Fr. — Ziemlich häufig an Laubholzstümpfen.

#### Russulaceae

*Russula delica* Fr. — Luckau: Weissacker Park (27. 7. 61).

*R. claroflava* Grv. — Briesener See bei Lübben (11. 6. 61); Weissack am Buschteich; Schlagteich bei Bornsdorf (27. 7. 61).

*R. cyanozantha* (Schaeff.) Secr. — Park von Zinnitz (27. 7. 61).

*R. badia* Quél. — Luckau: Am Sandteich bei Drehna (26. 7. 61).

*R. xerampelina* (Schaeff.) Fr. — Luckau: Am Gr. Teich bei Wanninchen (27. 7. 61).

*R. pectinatoides* Peck — Golßen: Rietzneuendorf, zwischen trockenem Gras (M, 1948).

*R. sardonica* Fr. — Zerstreut in den Kiefernwäldern, bei Vetschau; Göritz am Mühlenfließ auch im Eichen-Birken-Wald (14. 9. 61).

*R. decolorans* Fr. — Luckau: Kiefernwald zwischen Bergen und Weissack; Rochauer Heide bei Neusorgefeld (Juli 1961).

*R. virescens* (Schaeff.) Fr. — Golßen: Dornswalde (M, 1949).

*Lactarius theiogalus* Bull. ex Fr. — Sonnewalde: Am Forsthaus Brehnitz im Eichen-Hainbuchen-Wald (Juli 1961).

*L. vietus* Fr. — Zerstreut in feuchten Birken-Kiefern-Mischbeständen, so an den Borsdorfer Teichen und im Drehnaer Park am Ziegelteich (Sept. 1961).

*L. pyrogalus* (Bull.) Fr. — Golßen: Rietzneuendorf, im Grase eines Gartens (M, 13. 9. 46).

#### Lycoperdaceae

*Calvatia caelata* (Bull.) Morg. — Kotsemke bei Lubsko (Sommerfeld), einzeln (M, 1937); Lübbenauer Heide am Nordufer des Seesenteiches (14. 9. 61).

*C. saccata* (Vahl.) Morg. — Reichwalde, Erlen-Eschen-Wald an der Berste (März 1961).

#### Sclerodermataceae

*Pisolithus arenarius* Alb. & Schw. — Lubsko (Sommerfeld): Kotsemke, trockene Heide zerstreut (M).

#### Nidulariaceae

*Cyathus striatus* Huds. — Luckau: Weissacker Park, zahlreich an einem Eichenstumpf und auf dem Hauptweg des Parkes (27. 7. 61).

### Literatur

JAAP, O. (1922): Weitere Beiträge zur Pilzflora von Triglitz in der Prignitz. — Verhandl. botan. Ver. Prov. Brandenburg **64**, S. 1-60.

ULBRICH, E. (1938): Das Pilzjahr 1937. — Verhandl. botan. Ver. Prov. Brandenburg **78**, S. 1-27.

Anschrift des Verfassers:

Wolfgang Fischer, wissenschaftlicher Assistent  
am Institut für Landesforschung und Naturschutz Halle/S.,  
Zweigstelle Potsdam,  
Potsdam-Babelsberg, Wichgrafstraße 6

Verlag: Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig KG, Leipzig  
Alle Rechte vorbehalten

Printed in Germany · Druckgen. Nr. 105/48/63

III/14/8 VEB Graphische Werkstätten Zittau-Görlitz 0,5 1761