

Kurze Originalmitteilungen

Berosus bispina Reiche et Saulcy in der Oberlausitz

(Col. Hydrophilidae)

Von BERNHARD KLAUSNITZER

Nach HORION (1949, 1951) ist *Berosus bispina* Reiche et Saulcy in Deutschland in der Pfalz und im Rheinland an verschiedenen Orten gefunden worden.

Am 29. 7. 1964 konnte ich bei einem Lichtfang, der von der Zoologischen Feldstation der TU Dresden in Guttau durchgeführt wurde, 8 Exemplare von *Berosus bispina* fangen. Herrn K. HOCH, Bonn, danke ich für die freundliche Mühe der Bestimmung des Materials, und Herrn H. SCHAEFLEIN, Straubing, bin ich für seine Unterstützung dankbar.

Die Zoologische Feldstation liegt in unmittelbarer Nähe des Guttauer Teichgebietes. Es läßt sich leider nicht sagen, aus welchem Gewässer die Käfer stammen. Nach HOCH (in lit. an H. SCHAEFLEIN) ist *Berosus bispina* schwach halophil, kann aber auch „recht gut und lange in Süßwasser leben“. Von VOGEL (1966) wurde die Art bei seinen Untersuchungen nicht gefunden, auch H. SCHMIDT, Gersdorf, führt in seinem Katalog keinen Fund von *Berosus bispina* an.

Vielleicht gelingt es, dieses faunistisch interessante isolierte Vorkommen genauer zu lokalisieren, um die ökologischen Verhältnisse, unter denen *Berosus bispina* hier lebt, kennen zu lernen.

Literatur

- HORION, A. (1949): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer, II, Frankfurt am Main.
— (1951): Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas. — Stuttgart.
VOGEL, J. (1966): Faunistisch-ökologische Untersuchungen an Wasserinsekten eines Oberlausitzer Karpfenteiches. — Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 41, 5.

Anschrift des Verfassers:

Dipl.-Biol. Bernhard Klausnitzer
86 Bautzen, Leibnizstraße 4