

Kurze Originalmitteilungen

Bemerkenswerte Pilzfunde aus der Oberlausitz

Von GERHARD ZSCHIESCHANG

Alle Arten, bis auf eine, im Text gekennzeichnete, Ausnahme sind eigene Funde.

**Ascomycetes**

*Hypomyces chrysospermus* (Bull.) Tul., Goldschimmel;  
dieser, vor allem auf der Ziegenlippe und ihren Verwandten, auch dem Kremp-  
ling, schmarotzende Ascomycet befällt selten auch andere Arten: 29. 7. 1967,  
1 km südlich von Wiednitz, Kreis Hoyerswerda, am Blauen See, auf *Pisolithus*  
*tinctorius* (Pers.) Coker und Couch (Erbsenstreuung) und 19. 8. 1967, am glei-  
chen Ort, auf *Scleroderma aurantium* L. ex Pers. (Kartoffelbovist).

*Mitrulela paludosa* Fr., Sumpf – Haubenpilz;

18. 6. 1967 etwa 1,5 km nördlich von Berthelsdorf, Kreis Löbau, im Hinteren  
Flüßel.

*Mitrophora semilibera* (DC ex Fr.) Lév., Glockenmorchel;

11. 5. 1968 Herrnhut, Hutberg.

*Peziza saniosa* Schrad. ex Fr., Violettmilchender Becherling;

4. 10. 1968 Herrnhut, Hengstberg; in Gesellschaft von *Inocybe petiginosa*.

*Rutstroemia sydowiana* (Rehm) White;

7. 9. 1968 Herrnhut, Eulwald, am Sommerbad. Auf Eichenblättern.

**Basidiomycetes**

*Clavariadelphus fistulosus* (Fr.) Corner, Röhrenkeule;

5. 10. 1968 Herrnhut, Heinrichsberg.

*Sarcodontia setosa* (Pers.) Donk, Schwefelgelber Stachelchwamm;

23. 12. 1966 etwa 200 m nördlich von Berthelsdorf, Kreis Löbau. In Böhmen  
häufig, in Sachsen bisher selten (nach Kreisel).

*Naematelia encephala* Pers. ex Fr., Alabaster – Kernling;

18. 6. 1967 etwa 1,5 km nördlich von Berthelsdorf, Kreis Löbau, an Fichten-  
stümpfen.

*Ganoderma lucidum* (Leysser ex Fr.) P. Karsten, Glänzender Lackporling;  
21. 12. 1968 Strahwalde, Kreis Löbau, am „Niederhof“, an lebender Esche (*Fra-  
xinus excelsior*). Für Deutschland ist Esche als Wirt bisher nicht angegeben.

*Inonotus cuticularis* (Bull. ex Fr.) P. Karsten, Häutiger Schillerporling;

4. 8. 1967 Herrnhut, Heinrichsberg, an Rotbuche (*Fagus silvatica*).

- Abortiporus biennis* (Bull. ex Fr.) Singer, Rötender Wirrling;  
12. 10. 1968 Zittau, Westpark, auf halbvergrabenen Aststückchen.
- Trametes extenuata* Dur. & Mont., Braune Borstentramete;  
11. 6. 1967 Berthelsdorf, Kreis Löbau, am alten Gutshof, an Eschenstumpf.
- T. contragosa* (Bolt. ex Fr.) Joerstadt – var. *contragosa*, Rötende Tramete;  
12. 10. 1968 Zittau, Westpark; 27. 3. 1967 Herrnhut, Christian-David-Straße, an Walnuß (*Juglans*). Um Herrnhut nicht selten, meist an Weide.
- T. hoehnelii* (Bres.) Pilát, Spitzwarzige Tramete (det. Dr. H. JAHN);  
26. 10. 1967 ca. 1,5 km nördlich von Berthelsdorf, Kreis Löbau, am Hinteren Flüßel, an Schwarzerle (*Alnus glutinosa*).
- Tyromyces lacteus* (Fr.) Murill, Milchweißer Saftpörling;  
27. 8. 1967 Oybin, am Berg Oybin.
- Strobilomyces floccopus* (Vahl in Fl. Dan. ex Fr.) Karst., Strubbelkopfröhrling;  
29. 8. 1967, Herrnhut, Hengstberg (leg. J. STIESING).
- Gyroporus castaneus* (Bull. ex Fr.) Quél., Hasenröhrling;  
8. 8. 1967 Herrnhut, Heinrichsberg.
- Boletus pulverulentus* Opat., Schwarzblauer Röhrling;  
7. 8. 1967 Herrnhut, Hutberg.
- Pleurotus columbinus* Quél. ap. Bres., Taubenblauer Seitling;  
3. 12. 1967 Herrnhut, Löbauer Straße.
- Hygrophorus melizeus* Fr., Birkenschneckling;  
31. 10. 1968 Herrnhut, Hutberg. Auf diese Art, die von F. GRÖGER 1962 erstmals für Deutschland nachgewiesen wurde, sollte auch in unserem Gebiet geachtet werden.
- Hygrocybe unguinosa* (Fr.) Karst., Grauer Saftling;  
4. 11. 1968 Herrnhut, Hutberg.
- Tricholoma columbella* (Fr.) Kummer, Seidiger Ritterling;  
28. 10. 1966 Herrnhut, Eulwald, am Sommerbad.
- T. sudum* (Fr.) Quél., Falbgrauer Ritterling;  
21. 9. 1968 ca. 1 km südlich von Wiednitz, Kreis Hoyerswerda, Kiefernforst.
- Leucopaxillus giganteus* (Fr.) Sing., Riesen-Krempentrichterling;  
24. 8. 1967 Herrnhut, Hutberg. Hexenring mit ca. 160 Exemplaren, Durchmesser 16 m.
- Collybia tuberosa* (Bull. ex Fr.) Quél., Braunknolliger Sklerotienröbling;  
7. 9. 1968 Herrnhut, Eulwald; 21. 9. 1968 1 km südlich von Wiednitz, Kreis Hoyerswerda, am Blauen See.
- C. cookei* (Bres.) J. D. Arnold, Gelbknolliger Sklerotienröbling;  
12. 10. 1968 Zittau, Westpark; 13. 10. 1968 Herrnhut, ca. 100 m südwestlich vom Bahnhof, in Gesellschaft der vorigen Art.
- Tephrocybe palustre* (Peck) Donk, Sumpf-Graublatt;  
6. 7. 1968 ca. 1,5 km südlich von Wiednitz, Kreis Hoyerswerda, am Sportbad, zwischen *Sphagnum*.
- Asterophora lycoperdoides* (Bull.) Ditm. ex S. F. Gray, Stäubender Zwitterling;  
13. 9. 1967 Herrnhut, Heinrichsberg.

- Marasmius cohaerens* (Pers. ex Fr.) Fr., Beschuhter Schwindling;  
2. 9. 1966 Herrnhut, Hutberg.
- Crinipellis stipitarius* (Fr.) Pat., Behaarter Schwindling;  
19. 9. 1968 Zittau, Leipziger Straße; 4. 11. 1968 Herrnhut, Hutberg.
- Baeospora myosura* (Fr. ex Fr.) Sing., Mäuseschwanz-Rübling;  
19. 10. 1967 Herrnhut, Hengstberg.
- Rhodophyllus porphyrophaeus* (Fr.) Lge., Porphyrbrauner Rötling;  
1. 11. 1968 Herrnhut, Hutberg.
- Amanita inaurata* Secr., Doppeltbescheideter Wulstling;  
6. 8. 1968 Herrnhut, Hutberg.
- A. gemmata* (Fr.) Gill., Narzissengelber Wulstling;  
19. 10. 1967 Herrnhut, Hengstberg.
- Volvariella murinella* (Quél.) Mos., Mausgrauer Scheidling;  
11. 8. 1967 Herrnhut, Privatgrundstück Goethestraße 5.
- Pluteus aurantiorugosus* (Trog.) Sacc., Scharlachroter Dachpilz;  
31. 8. 1967 Herrnhut, Hutberg, 14 Exemplare an zwei benachbarten Eschen-  
stümpfen. 4. 6. 1968 und 1. 9. 1968 je 1 Exemplar.
- P. phlebophorus* (Dittm. ex Fr.) Kummer, Netzadriger Dachpilz;  
31. 7. 1968 Herrnhut, Privatgrundstück Goethestraße 5, auf Boden.
- Agaricus haemorrhoidarius* Kalchbr. et Schulz., Großer Blutchampignon;  
29. 9. 1967 Herrnhut, am Kirchensaal; als Hexenring um *Chamaecyparis pisi-  
fera*. Die kleinsporige Art!
- Melanophyllum echinatum* (Roth ex Fr.) Sing., Blutblättriger Zwergschirm-  
ling; 10. 9. 1967 Herrnhut, Goethestraße 5.
- Lepiota castanea* Quél., Rotbrauner Zwergschirmling;  
17. 10. 1968 Herrnhut, Bleiche, an halbruderalem Standort.
- Cystoderma cinnabarium* (A. & S. ex Secr.) Fay., Zinnoberbrauner Körnchen-  
schirmling; 9. 10. 1968 Herrnhut, Heinrichsberg.
- Coprinus alopecia* Lasch ex Fr., Schuppenstieler Tintling;  
6. 7. 1968 Bernsdorf OL., Kreis Hoyerswerda, Kamenzer Straße, an Basis von  
Spitzahorn (*Acer platanoides*). Dort seit 1966.
- Psathyrella cernua* (Vahl ex Fr.) Mos., Dunkelsporiger Faserling;  
24. 11. 1967 Herrnhut, Hengstberg; 2. 11. 1968 Herrnhut, Zinzendorfplatz.
- P. sarcocephala* (Fr.) Sing. ss. Mos. 1967, Schokoladenbrauner Faserling;  
2. 11. 1968 Herrnhut, Hengstberg, an Rotbuche (*Fagus sylvatica*).
- Conocybe lactea* (Lge.) Metr., Milchweißes Samthäubchen;  
18. 8. 1967 Herrnhut, Goethestraße 5.
- Hypholoma elongatipes* Peck, Torfmoos-Schwefelkopf;  
15. 9. 1968 ca. 1,5 km nördlich von Berthelsdorf, Kreis Löbau, am Hinteren  
Flüßel.
- Inocybe bresadolae* Mass., Rötlichfuchsigter Risfpilz;  
28. 6. 1968 Zittau, Westpark. Nach P. EBERT Erstnachweis für Sachsen.

*I. dulcamara* (A. & S. ex Pers.) Kummer, Olivgelber Rißpilz;  
18. 9. 1968 Herrnhut, Zinzendorfplatz.

*I. petiginosa* (Fr. ex Fr.) Gill., Graugezonter Rißpilz;  
7. 9. 1968 Herrnhut, Eulwald, unter Eichen.

*Hebeloma pumilum* Lge., Zwergfälbling;  
23. 9. 1967 Herrnhut, Lindenallee.

*Cortinarius orellanus* (Fr.) Fr., Orangefuchsiger Hautkopf;  
24. 9. 1967 und 9. 10. 1968 Herrnhut, Heinrichsberg.

*Galerina sphagnorum* (Pers. ex Fr.) Kühn., Sumpfhäubling;  
27. 8. 1968 Berthelsdorf, Kreis Löbau, am Hinteren Flüßel.

*Russula azurea* Bres., Violetter Reiftäubling;  
15. 9. 1968 1 km nördlich von Berthelsdorf, Kreis Löbau, am Julienstein. Bei Fichten.

*R. lilacea* Quél., Rotstieliger Reiftäubling;  
29. 7. 1968 Herrnhut, Eulwald.

*R. rosea* Quél., Rosenroter Täubling;  
9. 8. 1968 Herrnhut, Eulwald. Bei Rotbuchen.

*Lactarius spinosulus* Quél., Schüppchenmilchling;  
18. 10. 1968 Herrnhut, Eulwald. An feuchtem Standort, bei Birken und Fichten.

*Lycoperdon echinatum* Pers., Igelstäubling;  
13. 9. 1967 Herrnhut, Heinrichsberg.

Anschrift des Verfassers:

Gerhard Zschieschang,  
8709 Herrnhut,  
Goethestraße 5