

ABHANDLUNGEN UND BERICHTE DES NATURKUNDEMUSEUMS GÖRLITZ

Band 53, Nummer 9

Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 53, 9: 13-14

Erschienen am 1. 7. 1980

Kurze Originalmitteilungen

Zur Situation der geschützten Pflanzenarten im Kreis Bischofswerda

Von HANS-WERNER OTTO

(Arbeitsergebnisse der Fachgruppe Floristik Kreis Bischofswerda
im Kulturbund der DDR)

Durch die „Anordnung zum Schutze von wildwachsenden Pflanzen und nicht-jagdbaren wildlebenden Tieren vom 6. Juli 1970“ sind in der Deutschen Demokratischen Republik 108 Pflanzenarten unter Schutz gestellt. Im Kreis Bischofswerda (Bezirk Dresden) wurden davon insgesamt 33 Arten beobachtet. Nach ihrer Häufigkeit und dem Grad ihrer Gefährdung lassen sich im Jahre 1978 vier Gruppen unterscheiden:

1. Erloschene und verschollene Arten: 16	Anzahl der bekannt- gewordenen Vorkommen	Jahr der letztmaligen Beobachtung
Sumpf-Sitter (<i>Epipactis palustris</i>)	2	1950
Holunder-Kuckucksblume (<i>Dactylorhiza sambucina</i>)	3	um 1900
Grüne Hohlzunge (<i>Coeloglossum viride</i>)	1	vor 1900
Große Händelwurz (<i>Gymnadenia conopsea</i>)	2	um 1900
Kleines Knabenkraut (<i>Orchis morio</i>)	1	1950
Zweiblättrige Waldhyazinthe (<i>Platanthera bifolia</i>)	9	1960
Blattloser Widerbart (<i>Epipogium aphyllum</i>)	2	1936
Gemeiner Flachbärlapp (<i>Diphysium complanatum</i>)	3	1949
Gemeiner Moorbärlapp (<i>Lepidotis inundata</i>)	4	1970
Grünblütiges Wintergrün (<i>Pyrola chlorantha</i>)	1	1913
Rundblättriges Wintergrün (<i>Pyrola rotundifolia</i>)	3	1929
Einblütiges Moosauge (<i>Monesis uniflora</i>)	6	1965
Feld-Enzian (<i>Gentiana campestris</i>)	3	1916
Seidelbast (<i>Daphne mezereum</i>)	3	um 1930
Türkenbund-Lilie (<i>Lilium martagon</i>)	1	1951
Rundblättriger Sonnentau (<i>Drosera rotundifolia</i>)	7	1965

2. Arten, die zur Zeit nur ein bis zwei Vorkommen im Kreis besitzen: 6

	Vorkommen insgesamt	noch vorhandene Vorkommen
Gemeiner Wachholder (<i>Juniperus communis</i>)	1	1
Tannen-Teufelsklaue (<i>Huperzia selago</i>)	4	1
Märzenbecher (<i>Leucojum vernalis</i>)	1	1
Gefleckte Kuckucksblume (<i>Dactylorhiza maculata</i>)	8	2
Braunrote Sitter (<i>Epipactis atrorubens</i>)	1	1
Lungen-Enzian (<i>Gentiana pneumonanthe</i>)	5	1

3. Arten mit mehr als zwei Vorkommen im Kreis, die aber durch Standortveränderungen in starkem Rückgang begriffen sind: 5

Großes Zweiblatt (*Listera ovata*)

vor 1950 20 Vorkommen, nach 1960 noch 9 Vorkommen bekannt, nach 1970 noch 4 Vorkommen.

Breitblättrige Kuckucksblume (*Dactylorhiza majalis*)

Vor 1950 20 Vorkommen, nach 1960 noch 17 Vorkommen bekannt, nach 1970 nur noch 6.

Arnika (*Arnica montana*)

Vor 1950 mehr als 30 Vorkommen, nach 1970 bisher nur sehr wenige Vorkommen bestätigt.

Wald-Primel (*Primula elatior*)

Vor 1950 13 Vorkommen, nach 1970 noch keine exakten Aussagen möglich.

Breitblättrige Sitter (*Epipactis helleborine*)

Vor 1950 14 Vorkommen, nach 1960 9 Vorkommen, nach 1970 4 Vorkommen.

4. Arten mit mehreren Vorkommen im Kreisgebiet, die z. Z. noch relativ ungefährdet sind: 6

Maiglöckchen (<i>Convallaria majalis</i>)	mehr als 30 Vorkommen
Keulen-Bärlapp (<i>Lycopodium clavatum</i>)	etwa 30 Vorkommen
Schlangen-Bärlapp (<i>Lycopodium annotinum</i>)	5 Vorkommen
Kleinblütiges Wintergrün (<i>Pyrola minor</i>)	mehr als 15 Vorkommen
Einseitwendiges Birngrün (<i>Orthilia secunda</i>)	5 Vorkommen
Wald-Geißbart (<i>Aruncus sylvestris</i>)	etwa 10 Vorkommen

Anschrift des Verfassers:

Hans-Werner Otto,

8500 Bischofswerda,

Straße der Freundschaft 20