

3.

Botanik.

I. *Prodromus Florae Lusatiae.**Monitus praemissus.*

Plantae plurimae, in „Dettels Verzeichniß der in der Oberlausitz wild wachsenden Pflanzen“ cum signo Gm. aut Fr. receptae, ab initio vel dubiae vel falsae erant, et postea nullibi repertae sunt.

Classis I. Monandria.

Digynia.

- Callitriche verna* L. Wasserstern. In aquis lente fluentibus vel stagnantibus, vulgo. Majo, Jun. Jul. Annua.
- — β *intermedia* Schkuhr. (dubia Roth)
- — γ . *caespitosa* Schulz (minima Hoppe)
In inundatis um Riesky.
- *autumnalis* L. In rivulis. Aug. Sept. Oct. Annua.

Classis II, Diandria.
Monogynia.

- Lemna minor* L. Wasserlinsen. Entengrün. In stagnis abunde. Jun. Jul. Annuā.
- *gibba* L. Cum priore, parcior.
- *polyrrhiza* L. Ibidem.
- Fraxinus excelsior* L. Esche. In sylvis montanis et in pagis. Apr. Maj. Arbor.
- Ligustrum vulgare* L. Liguster. Rheinweide. Zaunriegel. Ad sepes, hinc inde. Jun. Frutex.
- Syringa vulgaris* L. Blauer, türkischer, spanischer Flieder. Ad sepes. Majo. Frutex.
- — β Flore albo.
- Circaea lutetiana* L. Herenkraut. In nemoribus et sylvis humidiusculis. Jul. Perenn.
- *alpina* L. In sylvaticis umbrosissimis penes Niesky frequens; auch auf der Lausche. Jul. Aug. Perennis.
- — β *intermedia* Ehrh. (major Schrad.) Ad sepes dumosas umbrosas hinc inde. (Görl. Heide, s. Laus. Magaz. Bd. 2.)
- Veronica longifolia* Schrad. (maritima Oett.) Blauer Weiderich. In dumetis an der Meisse. Jul. Aug. Perenn.
- *spicata* L. Uehriger Ehrenpreis. Um Priebus, Schnellfürthel. Jul. Aug. Perenn.
- — β *spicis pluribus*. Cum priore.
- *serpyllifolia* L. Ehrenpreisweiblein. In graminosis humidis: planta admodum varians. Maj. Oct. Perenn.
- *scutellata* L. Schild-Ehrenpreis. In inundatis, ad margines stagnorum. Jul. Aug. Perennis.
- — β Presl. caule prostrato radicante.

- Veronica Anagallis* L. Wassergauchheil. In fossis et aquis pagorum. Jul.—Sept. Ann. (Obs. Inter *V. Anagallidem* et *Beccabungam* formas intermedias observavi, quarum determinatio difficillima)
- *Beccabunga* L. Bachbungen. Pfunde. In fossis, ad rivulos, praecedente frequentior. Jun.—Sept. Perennis.
- *officinalis* L. Ehrenpreis. Ehrenpreis-männlein. In nemorosis siccis. Jun. — Sept. Perennis.
- *montana* L. Berg-Ehrenpreis. In humidis umbrosis am Eulenstein olim inventa, nunc frustra quaesita. (Bei Messersdorf.) Junio. Perenn.
- *Chamaedrys* L. Blauer Wiesen-Ehrenpreis. Gamanderlein. In nemorosis, ad sepes, vias, ubique. Maj. Jun. Perenn. (Verosimile varietas quaedam ab Oettel sub nomine *V. pilosae* indicatur).
- *latifolia* Aiton. (*V. Teucrium Autorum*) Edler Ehrenpreis. In montosis apricis. Jul. Aug. Perenn.
- — α major Schrad.
- — β minor idem.
- (prostrata L.)
- *arvensis* L. Feld-Ehrenpreis. In agris, frequens. Apr. — Jul. Annua.
- *agrestis* L. (pulchella Bast. versicolor Fries) blauer Vogelmeier. In agris. Mart. — Sept. Annua.
- (*Buxbaumii* Tenore. hospita Mert. et Koch) Varietates duas α et β secundum Mert. et Koch cl. Reichenbach non probat. v. Reichenb. Iconograph. Cent. III.

Veronica hederifolia L. Kleiner Sundermann.

In agris et cultis, copiose. Mart. —

Maj. Annua.

— *triphyllus* L. Blaues Hungerblümchen.

In agris, solo fertilior. Planta odo-

rem *Spergulae arvensis* non dissimilem

habet. Mart. Apr. Ann.

— *verna* L. Frühlings-Ehrenpreis. In agris

praesertim arenosis, praecedente serior

floret. Apr. Maj. Annua.

(Obs. *Veronicam praecocem*, secundum

Mert. et Koch in Lusatia, nunquam

in regione nostra vidi.)

Gratiola officinalis L. Gottes-Gnade. Aller

Heiligen Kraut. Ad margines stagno-

rum um Rietschen, Werda, Neuham-

mer. Jul. Aug. Perenn.

Pinguicula vulgaris L. Fettkraut, Schmeerkraut.

In pratis uliginosis bei Diehsa. Maj.

Jun. Perenn.

Utricularia vulgaris L. Wasserschlauch. In

stagnis et fossis infrequens. Jul.

Aug. Perenn.

— *intermedia* Hayne. Bei Rietschen. Jul.

Aug. Perenn.

— *minor* L. Bei Kreba und Horfa. Jun.

Aug. Perenn.

(Obs. *Utriculariae omnes maxime steri-*

les a nobis observantur. Tempestas

secunda solummodo flores trudit.)

Lycopus europaeus L. Wasserandorn. Wolfs-

fuß. Ad fossas, ripas. Jun. - Sept. Perenn.

Salvia pratensis L. Wilde Salbey. In Jauer-

nif. Maj. — Jul. Perenn.

Digynia.

Anthoxantum odoratum L. Gelbes Ruchgras.
Melilotengras. In pratis, ad vias, ubi-
que. Maj. Jun. Perenn.

Classis III. Triandria.

Monogynia.

Valeriana officinalis L. Baldrian. In dume-
tis, ad rivulos. Jul. Aug. Perenn.
— *dioica* L. Kleiner Baldrian. Zwischen Groß-
Schönau und Waltersdorf und im Spree-
wald. Maj. Jun. Perenn.

Fedia dentata Vahl (Valeriana) Feld-Repunde.
In agris frequens. Jul. Aug. Annua.

— *politoria* Gärtn. Garten-Repunde, Ingra-
mineis. Maj. Annua.

Montia fontana L. Flachs-salat. Tota aestate.
Perennis.

— *α minor*. In agris humidis ad Niesky,
frequens.

— *β major*. Ad scaturigines et in rivulis.

Polycnemum arvense L. Knorpelkraut, In agris.
Debernitz, Niesky, Ross, Gutte. Jul. Aug.
Annua.

Gladiolus communis L. Schwertel, runde Sieg-
wurz, runde Allermannsharnisch. In pra-
tis nemorosis. Im Oberlande bei Schön-
brunn, im Unterlande bei Allersdorf. Jun.
Jul. Perennis.

(Obs. *Gladiolus neglectus* Schult. — sola
varietas esse videtur.)

Iris Pseudacorus L. gelber Schwertel. Falscher
Kalmus. In stagnis, ad ripas. — Maj.
Jun. Perenn.

Iris sibirica L. schmalblättriger Himmelschwertel.

Um Dausen. Maj. Jun. Perenn.

— (*germanica* L.) In pomariis culta, non sponte. Maj. Perenn.

Cyperus flavescens L. gelbes Cypergras. In inundatis um Niesky. Sept. ann. Plantula autumnalis.

— *fuscus* L. braunes Cypergras. Bei Reichwalde. Aug. Sept. Annua.

Scirpus palustris L. Sumpfbinsengras. In fossis, paludibus, ubique. Jun. — Aug.

Perennis.

α major.

β minor.

— (*caespitosus*)

— *ovatus* Roth. (*capitatus* Schreb.) Eiförmige Binse. In locis udis. Niesky, Marktissa. Jun. Jul. Annuus.

— *acicularis* L. Nadelbinse. In inundatis, uliginosis. Jun. — Aug. Ann.

— *Baeothrion* Ehrh. Torfbirse. In uliginosis um Niesky. Jun. Jul. Perenn.

— *lacustris* L. Seebirse. Pferdebinse. In lacubus profundis. Jun. Jul. Perenn.

— *setaceus* L. Borstenbinse. In inundatis, agris humidis. Jul. Aug. Ann.

— *maritimus* α Uferbinse. Meerbinse. In fossis, lacubus. Jun. Jul. Perenn.

— β *compactus* Krock. Ad margines stagnorum.

— *sylvaticus* L. Waldbinse. In pratis paludosis ad fossas, ripas. Jun. Jul. Perenn.

— *radicans* Schkuhr. wurzelnde Binse. In

pratis inundatis bei Quitzdorf und an
der Reife. Jun. — Aug. Perenn.

Schönus *albus* L. Weißes Knopfgras. In pra-
tis uliginosis im Haidelande abunde. Jul.
Aug. Perennis.

— *fuscus* L. Braunes Knopfgras. In tur-
fosis um Niesky. Jun. Jul. Perenn.

Eriophorum *vaginatatum* L. (caespitosum Host.)
Rasenvollgras. In paludibus ericetorum
saepius bipedale et ultra. Im Oberlande
im Dybinthal, Lichtwalde, Messersdorf.
Apr. Maj. Perenne.

— *latifolium* Hoppe, Wiesenvolle. Binsenseide.
In pratis uliginosis. Apr. Maj. Perenn.

— *angustifolium* Roth. Wollgras. In palu-
dibus vulgo. Apr. Maj. Perenn.

Nardus *stricta* L. Borstengras, klein Pfriemen-
gras. In arenosis, sterilibus, siccis et
udis, frequ. Jun. Jul. Perenn.

Digynia.

Alopecurus *pratensis* L. Wiesenfuchsschwanz. In
pratis pinguioribus. Maj. Jun. Perenn.

— *geniculatus* L. Knotenfuchsschwanz. In
inundatis et fossis. Jun. — Aug. Perenn.

— *paludosus* P. de Beauv. (fulvus Weihe)
Sumpffuchsschwanz. Locis similibus. Jun.
— Aug. Perenn.

Phalaris *arundinacea* L. Rohrglanzgras. Ad
ripas, in fossis. Jun. Jul. Perenn.

— *picta* Messersdorf.

Leersia *oryzoides* Sw. (*Phalaris* L.) Reißar-
tiges Glanzgras. Ad rivulos, fossas,
Niesky. Aug. — Oct. Perenn.

Panicum *sanguinale* L. Bluthirse. Himmels-

- than. In cultis et incultis. Jul. Aug.
 Annum.
- Panicum** ciliare Retz, gefranzte Bluthirse. In cul-
 tis. (Videtur varietas praecedentis.)
 Jul. Aug. Ann.
- glabrum Gaud. (Digitaria humifusa
 Pers.) glatte Bluthirse. In arenosis um
 Niesky frequ. Jul. Aug. Ann.
- crus galli L. Hirsegras. Hahnenhorn-
 fennich. In cultis et arvis humidis. Jul.
 Aug. Ann.
 α valvula breve aristata.
 β valvula longissime aristata.
- (verticillatum)
- viride L. Grünes Hirsegras. Grüner Fen-
 nich. Frequens in locis cultis, magni-
 tudine valde diversa. Jul. Aug. Ann.
- glaucum L. Graugrüner Fennich. In agris
 demessis. Um Niesky copiosissime. Aug.
 Ann.
- miliaceum L. Hirse. Cultum. Jul.
 Aug. Ann.
- Phleum** pratense L. Wiesen-Eischgras. In pra-
 tis fertilioribus rarius. Maj. — Aug.
 Perenne.
- β nodosum L. In versuris rarius.
- Boehmeri Wib. (Phalaris phleoides
 L.) Glanz-Eischgras. In collibus bei
 Baruth und Guffa. Jun. — Aug. Perenn.
- Milium** effusum L. Walb-Hirsegras. In syl-
 vis umbrosis, praesertim montosis. Maj.
 Jun. Perenn.
- Agrostis** Spica venti L. Windhalm. Ucker-
 Schmelen. Inter segetes. Jun. Jul.
 Annua.

- Agrostis vulgaris* With. kleines Hundsgras. In pratis et pascuis. Jul. Aug. Perenn.
- — β stolonifera Leers (tenella Hffm.) In humidis arenosis. Niesky.
- — γ pumila L. In siccis sterilibus.
- — δ spiculis viviparis.
- alba Schrad. Weißer Windhalm. In pratis, dumetis. Jul. Aug. Perenn.
- — β capillaris Leers.
- canina L. (*Trichodium caninum* Schrad.) Hundsg-Straußgras. In pratis humidis. Jul. Aug. Perennis.
- Arundo Calamagrostis* L. (A. Leersii Oett.) Biesenschilf. In sylvaticis udis. Niesky. Jul. Aug. Perenn.
- Halleriana Gaud. (A. Pseudophragmites Schrad.) Unächtes Rohrschilf. Ad fossas, in sylvaticis. Jul. Aug. Perenn.
- Epigejos L. Landrohr. In humidis et siccis nemorosis. Jul. Aug. Perenn.
- sylvatica Schrad. (*Agrostis arundinacea* L. Rohrschmele, Sauernick. Thiemendorf. Tzschocha. Jun. — Aug. Perenn.
- arenaria L. Adhuc in Lusatia non inventam, vidi 1825 unico in loco in der Niescher Halde. Jul. Aug. Perenn.
- Phragmites communis* Trin. (*Arundo Phragmites* L.) Schilf. Seichrohr. Ad ripas. Aug. Sept. Perenn.
- Arrhenatherum elatius* Beauv. (*Avena elatior* L.) Holcus avenaceus Schrad.) Biesenhafer. Hafergras. In nemorosis graminosis. Maj. — Jul. Perenn.

- Holcus lanatus* L. wolliges Pferdegras. Honiggras. In pratis fertilioribus copiose. Jun. — Sept. Perenn.
- *mollis* L. weiches Honiggras. In arenosis humidiusculis ad agrorum margines. Niesky, frequens. Jul. — Sept. Perenn.
- Aira caespitosa* L. Rasen-Schmelen. Glanzschmelen. In pratis humidis et turfosis freq. Colore spicularum varians. Jun. — Aug. Perenn.
- *canescens* L. Graue Schmelen. In solo arenoso ad Niesky vulgo. Jun. — Aug. Perenn.
- (Obs. *Aira montana* Oett. in monte Tafelsichte est varietas avenae flexuosae.)
- Avena sativa* L. Hafer. Culta. Jul. Annua.
- *orientalis* Schreb. Türkischer, ägyptischer Hafer. Inter praecedentem. Jul. Ann.
- *strigosa* Schreb. Rauchhafer. Barthhafer. Cum. A. sativa. Jul. Aug. Ann.
- *fatua* L. wilder Hafer. Flughafer. Tauber Hafer. Am Baugen. Jul. Aug. Ann.
- *flavescens* L. Goldhafer. Bei Görlitz. Jul. Aug. Perenn.
- *pubescens* L. haariges Hafergras. In pratis et nemoribus praecipue montosis. Maj. Jun. Perenn.
- *flexuosa* Schrank (*Aira* L.) Gebogene Schmiele. Flitterschmiele. In sylvis et ericetis vulgo. Jun. — Aug. Perenn.
- *caryophylla* Web. (*Aira* L.) Silbergras. Melkschmiele. In campis arenosis. Niesky. Jun. Ann.
- *praecox* Beauv. (*Aira* L.) kleine Sand-

schmele. In arenosis, ad vias. Nietsky.
Apr. — Jun. Ann.

Melica nutans L. Perl-Gras. Schöngras. In
nemorosis montosis, im Oberlande. Maj.
Jun. Perenn.

— *uniflora* Retz. Einblätthiges Perlgras.
In montosis. Maj. Jun. Perenn.

Koeleria cristata Pers. Var. *glauca*. Kamm-
schmele. Nietschen, Buchwalde. rarius.
Jun. Jul. Perenn.

Molinia coerulea Mönch (*Melica coerulea* L.)
blaue Schmelen. In pratis paludosis.
Jul. Aug. Perenn.

— — β *major*; ad sylvarum margi-
nes in paludibus.

Glyceria spectabilis M. et K. (*Poa aquatica*
L.) Wasser-Rispen-Gras. Ad ripas et
stagnorum margines. Jul. Aug. Perenn.

— *fluitans* R. Br. (*Festuca* L.) Schwaden.
Mannagrass. In aquosis ubique. Jun.
— Sept. Perenn.

— *aquatica* Presl. (*Aira* L.) In aquosis
rarior. Lubach. Nietschen. Maj. —
Jul. Perenn.

Poa annua L. Klein Viehgras. Pervulgata
ad vias, in arvis, cultis, floret totum
per annum. Ann.

— *bulbosa* β *vivipara* L. Knolliges Ris-
pengras. In versuris et montosis pas-
sim. Jun. Jul. Perenn.

— *sudetica* Hke. Breitblättriges Rispen-
gras. In monte Lausche. Jun. Jul.
Perenn.

— *trivialis* L. Gemeines Rispengras. In
pratis. Jun. — Aug. Perenn.

- Poa pratensis* L. Wiesen-Rispengras. In pratis
Maj. — Jul. Perenn.
- — β latifolia Weihe. In solo humido.
- — γ angustifolia L. In siccioribus.
- fertilis Host. (palustris Roth.) Vielblü-
thiges Rispengras. In humidis, fossis,
im Oberlande. Jun. — Aug. Perenn.
- nemoralis L. Wald-Rispengras. In
nemoribus. Jul. Aug. Perenn. Lu-
dit varietatibus pluribus.
- compressa L. Berg-Rispengras. In mu-
ris, rupestribus. Jun. Jul. Perenn.
- Briza media* L. Zittergras. Hasenbrod. In pra-
tis siccioribus. Maj. Jun. Perenn.
- Cynosurus cristatus* L. Kammgras. In pratis ver-
suris. Jun. Jul. Perenn.
- Dactylis glomerata* L. Hundsgras. Knaul-
gras. In pratis, ad viarum margines.
Jun. Jul. Perenn.
- Festuca Myurus* langgeschwänzter Schwingel. In
arena ad vias, circa arbores. Maj.
— Jul. Annua.
- ovina L. Schaaf-Schwingel. In collibus
arenosis, ericetis. Maj. Jun. Perennis.
- duriuscula Poll. harter Schwingel. In
pascuis et ericetis. Maj. — Jul. Perenn.
- glauca Schrad. grau-grüner Schwingel.
In sterilibus arenosis. Maj. — Jul.
Perenn.
- rubra L. Rother Schwingel. Ad vias,
in gramineis, pratis. Inter Festucas
haec vulgatissima. Jun. — Aug. Perenn.
- pratensis Huds. (elatior L.) Wiesen-
Schwingel. In pratis fertilioribus, häu-
figer im Oberlande. Jun. — Aug. Perenn.

- Festuca sylvatica* Vill. (*Poa trinervata* Ehrh.)
Wald-Schwingel. In fagetis umbrosis
montium. Jun. — Aug. Perenn.
- *gigantea* Vill. (*Bromus* L.) Großer
Schwingel. Futtertrefse. In dumetis
umbrosis. Jun. — Aug. Perenn.
- *aspera* M. et K. (*Bromus* L.) Rauher
Schwingel. In montosis. Jun. — Aug.
Perenn.
- Triodia decumbens* R. Br. (*Festuca* L.) Lie-
gender Schwingel. In pascuis sterilibus
et ad vias in humidis, copiose. Jun.
Jul. Perenn.
- Bromus secalinus* L. Trefse. Inter segetes.
Jun. Jul. Ann.
- *racemosus* L. (multiflorus Oett.) Trefse.
In arvis, ad vias, passim. Maj. Jun.
Ann.
- *mollis* L. Weiche Trefse. In pratis et
ad vias ubique. Maj. Jun. Annua et
biennis.
- — γ conglomeratus Pers.
- *sterilis* L. Saube Trefse. Bei Görlitz.
Jun. — Sept. Ann.
- *tectorum* L. Dach-Trefse. Landstrone.
Görlitz. Bausen. Maj. — Jun. Ann.
- Brachypodium sylvaticum* R. S. (*Bromus gra-
cilis* Weigel.) Wald-Trefse. In colli-
bus nemorosis. Jul. Aug. Perenn.
- *pinnatum* R. S. (*Bromus* L.) Gefie-
derte Trefse. In nemorosis montosis.
Jun. Jul. Perenn.
- Triticum vulgare* Vill. Weizen. Colitur. Va-
riat spica mutica et aristata, laxa et
compacta.

Triticum repens L. Quecken. In agris et ad
vias nimium. Jun. Jul. Perenn.

— — α flosculis muticis.

— — β — aristatis.

— caninum Schreb. Hundshaargras. (Ely-
mus L.) In sylvaticis umbrosis. Jun.
Jul. Perenn.

Secale cereale L. Korn. Roggen. Colitur.

— — Var. multicaulis. Stauden-Roggen.

Lolium perenne L. Winter-Volch. Englisch
Rangras. Vulgo ad vias. Jun. —
Aug. Perenn.

— — β tenue. In gramineis, passim.

— arvense With. Acker-Volch. In agris in-
ter Linum. Jun. Jul. Ann.

— temulentum L. Taumel-Volch. Tollkorn.
Inter segetes. Jun. Jul. Ann.

Elymus arenarius L. Sand-Hafer. Wilder
Weizen. Bei Moholz. Jul. Aug. Perenn.

— europaeus L. Wald-Haargras. Löbauer
Berg. Jun. Jul. Perenn.

Hordeum vulgare L. Gemeine Gerste

— hexastichum L. Sechszellige — } *Culta.*

— distichum L. Zweizeilige — }

— murinum L. Mäuse-Gerste. Taube Gerste.
In urbibus ad vias. Jul. Aug. Ann.

Trigynia.

Holosteum umbellatum L. Spurre. Melken-
gras. In arvis, pascuis, pollicare et
semipedale. Mart. Apr. Ann.

Classis IV. Tetrandria.

Monogynia.

Dipsacus sylvestris Mill. Wilde Kartendistel.

Olim ad Baruth et Lauske observata,
nunc in Lusatia inferiore circa Lübb-
ben frequens vidi. Jul. Aug. Biennis.

Dipsacus fullonum Mill. Zahme Karden. In
arvis hinc inde colitur.

Globularia vulgaris L. Blaue Maßlieben. Bei
Seidenberg. Junio, Perennis.

Scabiosa succisa L. Teufels-Abbiß. In pratis
abunde, praesertim regione ericetoso.
Aug. Sept. Perenn.

— — β glabrata.

— — γ uniflora Hagen. In ericeto-
rum pratis et siccis.

— arvensis L. Ucker-Scabiose. In agris,
versuris frequ. Majo — Sept. Perenn.

— — variat floribus carneis et albis.

— columbaria L. Lauben-Scabiose. In
collibus siccis. Gutte, Baruth, Dubrauke,
Hörnitz, Haynewalde. Jun. Jul. Perenn.

— — β ochroleuca. Um Görlitz.

Sherardia arvensis L. Kleine Ucker-Röthe.
In agris et locis cultis frequ. Jun. —
Sept. Annu.

Asperula odorata L. Waldmeister. Sternleber-
fraut. In sylvaticis montosis. Maj.
Jun. Perenn.

— galioides M. B. (*Galium glaucum* Hoffm.)
Labkraut-Waldmeister. In saxosis sylva-
ticis bei Haynewalde gegen Scheibe. Jul.
Aug. Perenn.

(Annotatio. *Galium montanum* Oett.
an eadem planta? Difficile explican-
dum est, quod cl. Oettel auctorum
nomina post species suas omisit.)

- Galium Aparine* L. Klebkraut. In cultis, ad sepes, frequ. Jun. — Sept. Annuum.
Variat fructibus fere glabris.
- *uliginosum* L. Klein weißes Meierkraut. Morast-Kabkraut. In pratis paludosis, ad fossas. Maj. — Jul. Perenn.
 - *palustre* L. Sumpf-Kabkraut. In fossis et paludibus vulgo. Maj. — Jul. Perenn.
 - *rotundifolium* L. Rundblättriges Kabkraut. In sylvis umbrosis. Bei Herrnhut, Messersdorf, Niesky, Hohenstein, Laasche, Hohwald, Löbauer Berg. Jul. Aug. Perenn.
 - *boreale* L. Wilde Wiesenröthe. Bei Preischwitz. Hörnig. Jul. Aug. Perenn.
 - *Mollugo* L. Weißes Kabkraut. In dumetis, versuris frequ. Maj. — Jun. Perenn.
 - — β elatum.
 - — γ rigidum (pauciflorum Wallr.)
 - *verum* L. Gelbes Kabkraut. U. L. Fr. Bettstroh. Nobis rarum. Zwischen Görlitz und Mays, Euldorf. Jun. — Aug. Perenn.
 - *sylvaticum* L. Wald-Kabkraut. In nemorosis montosis. Jul. Aug. Perenne.
 - *sylvestre* Poll. (scabrum Oett.) Hügel-Kabkraut. Auf dem Gutter Steinbruch, Zorger und Sproitzer Hügel, Hutberg. Jun. Jul. Perenn.
 - — β pusillum Hoffm.
 - *hercynicum* Weig. (saxatile Sm. et Mönch) Berg-Kabkraut. In montosis. Jul. Aug. Perenne.

- Plantago major* L. Wegebreit, breiter Wegerich.
Ad vias frequens. Jul. — Sept. Perenn.
- — β uliginosa Schm. In inundatis.
- *media* L. Schaafzunge, mittler Wegerich.
Zimtblume. In pratis, ad vias. Maj.
Jun. Perenn.
- *lanceolata* L. Spitz-Wegerich. Ad vias,
in pascuis vulgo. Aestate tota. Perenn.
- — β sylvatica Pers.
- — γ sphaerostachya.
- Centunculus minimus* L. Kleinling. In hu-
midis arenosis, agrorum sulcis. Niesky.
Im Oberlande seltener. Jun. — Aug.
Annuus.
- Sanguisorba officinalis* L. Wiesentkopsf, fal-
sche Bibernell. In pratis, largior im
Oberlande. Jun. — Aug. Perenn.
- Cornus sanguinea* L. Hartriegel. Dürlichen.
In montosis. Jun. Jul. Frutex.
- *mascula* L. Kornel-Kirsche. Colitur.
- *alba* L. Weißer Hartriegel. In hortis in-
ter frutices culta.
- Majanthemum bifolium* Dc. (*Convallaria bi-*
folia L.) Kleines Maiblümchen. In ne-
morosis umbrosis. Maj. Jun. Perenn.
(*Isnardia palustris* L. Cives dubia regio-
nis nostrae hodieque nullibi visa)
- Trapa natans* L. Wassernuß, Stachelnuß. Bei
Creba. Jul. Perenn. (Görlitzer Haide,
s. N. Laus. Magaz. Bd. 2. Hft. 1.)
- Parietaria erecta* M. et K. Glaskraut, Tag-
und Nachtkraut. Görlitz. Horka. Jul.
— Sept. Perenn.
- Alchemilla vulgaris* L. Frauenmantel. Sinau.
In pratis, pascuis. Jun. — Aug. Perenn.

Alchemilla β glabra.

- *arvensis* Scop. (*Aphanes arvensis* L.)
Klein Frauenmäntelchen. In arvis freq.
Jun. — Aug. Annua.

Tetragynia.

- Potamogeton natans* L. Flußlack, Saulöffel.
In stagnis freq. Jul. Aug. Perenn.
- *heterophyllus* Schreb. Leopoldshayn,
Petersshayn, Dedernitz. Jun. — Aug. Perenn.
- *rufescens* Schrad. In rivulis, fossis.
Rietschen, Wehlache. Jul. Aug. Perenn.
- *lucens* L. In stagnis fluviisque. Jul.
Aug. Perenn.
- *crispus* L. Cum praecedente, sed fre-
quentior. Jun. — Aug. Perenn.
- *acutifolius* Link. In aquis stagnanti-
bus, rarius. Jun. — Aug. Perenn.
- *obtusifolius* M. et K. Um Rietschen,
Neuhammer, See. Jun. — Aug. Perenn.
- *compressus* L. Bei Rlix. Jul. Aug. Perenn.
- *pusillus* L. a major. Bei Diehsa, Kup-
persdorf, Wehlache. Jul. Aug. Perenn.
- *pectinatus* Sm. In Großhennersdorf.
Jun. — Aug. Perenn.
- *densus* L. In aquis stagnantibus. Wei-
nau bei Zittau. Jun. — Aug. Perenn.
(Annot. Species omnes hujus generis vocan-
tur Laichkraut, Saamkraut.)

Sagina procumbens L. Mastkraut. In agris
humidis, pascuis, locis cultis. Tota
aestate. Perennans.

Radiola millegrana Sm. (*Linum Radiola*
L.) Kleinster Lein. Tausendforn. In are-
nosis udis. Aug. Sept. Annua.

Classis V. Pentandria.
Monogynia.

- Myosotis palustris* With. Wasser-Bergißmeinnicht. Ad rivulos, scaturigines. Maj. — Aug. Perenn.
— β strigulosa Rchb. Wiesen-Bergißmeinnicht. In pratis uliginosis copiose.
- *caespitosa* Schulz. Rasenartiges Bergißmeinnicht. In paludosis. Riesky. Jun. — Aug. Perenn.
- *sylvatica* Ehrh. Wald-Bergißmeinnicht. Auf der Lausche. Majo. Perenn.
- *intermedia* Link. Brach-Bergißmeinnicht. In arvis. Jun. — Aug. Biennis.
- *hispida* Schltddl. (collina Ehrh. Rchb.) Hügel-Bergißmeinnicht. In gramineis. Jun. — Aug. Annua.
- *versicolor* Pers. Buntblumiges Bergißmeinnicht. In agris. Maj. Jun. Annua.
- *stricta* Link. (arvensis Autorum) Acker-Bergißmeinnicht. In agris frequens. Apr. — Jul. Annua.
- *sparsiflora* Mikan. Schatten-Bergißmeinnicht. Auf der Landkrone. Maj. — Jul. Annua.
- Echinosperrum* Lappula Lehm. (*Myosotis* Lappula L.) Igel-Saame, Kletten-Mausohr. In ruderatis am Hengstberge und Dybin. Jul. Aug. Annua.
- Lithosperrum* arvense L. Acker-Steinsaame. Schminke. In agris frequens. Apr. — Jun. Annua.
- Anchusa* officinalis L. Ochsenzunge. Bei Görlitz, Malschwitz, Pribus. Maj. — Jul. Perenn.

- Anchusa arvensis* M.B. (*Lycopsis arvensis* L.)
 Ucker-Krummhals. Liebäugel. Baußen.
 Rottmarsdorf, Zittau, Pribus, Lübben.
 Jun. — Aug. Annua.
- Cynoglossum officinale* L. Hundszunge. Am
 Schönauer Hutberge. In pagis hinc inde,
 rarius; frequentior in Lusat. infer. Jun.
 Jul. Biennis.
- Pulmonaria officinalis* L. Lungenkraut. Blaue
 Schlüsselblume. In nemorosis, montosis.
 Apr. Majo. Perenn.
- Symphytum officinale* L. Schwarzwurz, Wall-
 wurz. In dumetis, ad rivulos. Maj.
 Jun. Perenn.
- — β albiflorum.
- Borago officinalis* L. Boretsch. In hortis et
 ruderatis. Jun. — Oct. Annua.
- Asperugo procumbens* L. Scharfkraut, blaues
 Klebkraut. In Baußen. Majo. Annua.
- Echium vulgare* L. Ratterkopf, wilde Ochsen-
 zunge. In arvis, locis sterilibus. Jun.
 Jul. Bienne.
- — β floribus albis.
- Primula officinalis* Jacq. (*P. veris* a. L.) Him-
 melschlüssel, Frühlingsprimel. Landskrone,
 Jauernick, Hörnitz. Apr. Majo. Perenn.
- *elatior* Jacq. (*P. inodora* Hoffm.) Große
 Schlüsselblume, geruchlose Primel. In pra-
 tis, montosis et ad rivulos im Oberlande.
 Mart. Apr. Perenn.
- *acaulis* Jacq. (*grandiflora* Lam.) Niedri-
 ge Primel. In pratis nemorosis am Soh-
 lander Berge. Mart. Apr. Perenn.
- Menyanthes trifoliata* L. Bitterflee, Fieberflee,
 In paludibus freq. Maj. Jun. Perenn.

- Hottonia palustris* L. Wasserfeder, Sumpfsiole.
In fossis, scrobibus et aquis lente fluentibus, im Unterlande häufiger. Maj. Jun.
Perenn.
- Lysimachia vulgaris* L. Gemeiner gelber Weiderich. Inter dumeta in paludosis, ad rivulos. Jun. Jul. Perenn.
- *thyrsiflora* L. Gelber Weiderich. Um Niesky, Kleinwelke, Großhennersdorf. Jun. Jul. Perenn.
- *nemorum* L. Gelber Waldmeier. In sylvaticis umbrosis montosis. Jun. Jul. Perenn.
- *Nummularia* L. Pfennigkraut, Egelkraut. In pratis paludosis, fossis. Jun. Jul. Perenn.
- Anagallis phoenicea* Lam. Rothe Niere, Gauchheil. In agris copiose. Jun.—Aug. Annu.
- Convolvulus arvensis* L. Ackerwinde. In agris, ad vias freq. Jun. Jul. Perenn.
- *sepium* L. Zaunwinde. In sepibus, dumetis, ad ripas. Jun. — Aug. Perenn.
- Jasione montana* L. Kleine Schaaf-Stabiose. In aridis ubique. Jun. Jul. Annu et bienn.
- Campanula rotundifolia* L. Milchglöckchen. In versuris siccis freq. Jun. — Aug. Per.
- — β Var. multiflora.
Varietatem singularem laciniis corollae decem observavi.
- *patula* L. Wiesen-Glockenblume. In pratis cop. Bienn.
- *persicifolia* L. Große Glockenblume, Waldrapunzel. In collibus nemorosis. Jun. Jul. Perenn.
- *latifolia* L. Breitblättrige G. In sylvaticis inter Oberwisß et Haynewalde olim observata.

Campanula Trachelium L. Halskraut, borstige Glockenblume. In sepibus nemorosis. Jul. Aug. Perenn.

— — β flore albo.

— *rapunculoides* L. Kriechende Glockenblume. Ad sepes, in cultis. Herba hortulano detestabilis. Jul. Aug. Perenn.

— *glomerata* L. Büschelglocke, klein Halskraut. Kengersdorf, Jauernick, Großhennersdorf. Jul. Aug. Perenn. Foliorum forma variabilis.

— *Cervicaria* L. Hirschkraut. Um Haynewalde, Grottau. Jul. Aug. Perenn.

Phyteuma spicatum L. Waldrapunzel. Um Seidenberg, Schönau, Jauernick, Runnersdorf bey Görlitz, Weissenberg. Maj. — Jul. Perenn.

Lonicera Caprifolium L. Geißblatt. Je länger je lieber. Ad sepes, dumeta, hinc inde, saepius culta. Jun. — Sept. Frutex.

— *Periclymenum* L. Je länger je lieber. Specklilie. Iisdem locis. Jun. Sept. Frut.

— *nigra* L. Schwarze Heckfirsche. Messersdorf, Lausche, Dybinthal. Maj. — Jun. Frut.

— (*tatarica* L. In hortis inter fruticeta colitur.)

Verbascum Thapsus L. Königskerze, Wollkraut. In siccis arenosis, ruderatis. Jun. — Aug. Bienn.

— *thapsiforme* Schrad. Königskerze, Wollkraut. Locis iisdem. Jun. — Aug. Bienn.

— (*phlomoides* L. Gerlachsheim.)

— *Lychnitis* L. Weißes Wollkraut. Bei Görlitz, Baruth, Gutta, Nieder-Gurke, Zittau, Königswartha. Jul. Aug. Bienn.

- Verbascum nigrum* L. Schwarze Königskerze.
In pagis, ruderatis. Jun. — Aug. Bienn.
- Datura Stramonium* L. Stechapfel. In locis
cultis et pagis, v. c. Creba, Steinbach,
Zittau. Jun. Jul. Annuum.
- Nicotiana Tabacum* L. Virginischer Tabak
— *rustica* L. Türkischer Tabak Jlitur
- Hyosciamus niger* L. Bilsenkraut. In cultis,
runderatis. Jun. — Sept. Ann. et bienn.
— *agrestis* Kit. Priore non satis diversa
videtur. Planta annua, caule simplice,
provenit verno tempore et in solo sicco
arenoso anno uno maturat. Plantae
biennes proveniunt aestate vel autumnno.
- Atropa Belladonna* L. Tollkirsche, Wolfskirsche.
Bei Kunewalde und auf dem Schülerberge.
Jul. — Sept. Perenn.
- Physalis Alkekengi* L. Judenkirsche. Nobis
non indigena, in hortis quasi sponte
hinc inde. Jun. Jul. Perenn.
- Solanum Dulcamara* L. Bittersüß, rother Nachtschatten.
In dumetis ad ripas. Jun. —
Aug. Frutex.
— *nigrum* L. Schwarzer Nachtschatten. In
runderatis passim, in hortis vulgo. Jul.
— Sept. Annuum.
— — β *melanocerasum* Hayne.
— — ϵ *villosum* W.
— *tuberosum* L. Erdbirne, Kartoffel. Culta
- Lycium barbarum* L. Bocksdorn, Teufelszwirn.
In hortis, ad muros, casas frondosas,
sepibus freq. cult.
- Erythraea centaurium* Pers. (Gentiana L.
Chironia Sm.) Erdgalle, Tausendgulden-
kraut. In pratis siccis. Jun. — Aug. Ann.

- Erythraea pulchella* Fries (ramosissima Pers.)
Kleines Tausendguldenkraut. Um Dstrib,
Baruth. Jul. — Sept. Annua.
- Rhamnus cathartica* L. Wegdorn, Kreuzdorn,
Kreuzbeere. In sepibus et montosis. Maj.
— Jun. Frutex.
- *Frangula* L. Faulbaum, Schießbeere. In
sylvis, dumetis, humidis, vulgo. Maj.
— Jul. Arborescit.
- Evonymus europaeus* L. Spindelbaum, Pfaf-
fenrösel, Pfaffenhütchen. In dumetis, ne-
moribus. Maj. Jun. Frutex.
- Ribes rubrum* L. Johannisbeere. In sepibus,
nemorosis. Apr. Maj. Frutex.
- — β baccis carneis
- — γ baccis albis
- *nigrum* L. Schwarze Johannisbeere, Sicht-
beere. Ad rivulos, in umbrosis nemo-
rosis et dumetis. Apr. Mjo. Frutex.
- *alpinum* L. Rosinenstrauch, Korinthenbeere,
wilde Johannisbeere. In montibus altio-
ribus, Lausche, Eschornebock, Löbauer Berg,
etiam in pagorum sepibus culta. Majo
Frutex.
- *Grossularia*. L. Stachelbeere. In se-
pibus, muris. Apr. Maj. Frutex.
- — β Uva crispa Klosterbeere, iisdem locis
- — γ reclinatum L. In hortis culta.
- Viola palustris* L. Sumpf-Weilchen. In paludi-
bus frequens. Maj. Jun. Perenn.
- uliginosa* Schrad. Moor-Weilchen. Um
Rietschen. Planta aliis locis Germaniae
rara, nobis loco indicato satis frequens.
Majo. Perenn.

- Viola hirta* L. Rauhes Weilchen. In nemorosis montosis saxosis. Apr. Majo. Perenn.
- *odorata* L. Märzweilchen, wohlriechendes Weilchen. In gramineis inter dumeta. Mart. Apr. Perenn.
- — β flore albo
- *canina* L. Hundswelchen. In sylvaticis. Apr. Majo. Perenn.
- — α lucorum Rchb.
- — β ericetorum Rchb. um Niesky vulgo.
- — γ sylvestris Kit. (nisi vera, forma tamen accedens.)
- — δ Riviniana Rehb. nobis vulgata.
- *persicifolia* Roth. (montana Auctor.) Berg-Weilchen. Auf der Lausche, und bei Pulsnig. Maj. Jun. Perenn.
- *biflora* L. Gelbes Berg-Weilchen. Auf der Tafelfichte. Saepius uniflora. Jun. — Aug. Perenn.
- *tricolor* L. Stiefmütterchen. Dreifaltigkeitsblume.
- — α grandiflora. Hayne. In pagis, arvis, pascuis.
- — β arvensis Hfm. (parviflora Hayne). In arvis freq.
- — γ hortensis. In hortis et cultis oleraceis.
- Impatiens nolitangere* L. Springkraut, Springsame, Judenhütlein. In umbrosis humidis, ad rivulos. Jul. Aug. Annua.
- Hedera Helix* L. Efeu, Immergrün. In sylvis et rupestribus. Oct. Nov. Frutex. Stirpes vetustae arborescentes solummodo florent.

Vitis vinifera L. Wein. Ad domos et in hortis culta. Vineae climate nostra inopportunae sunt; Lusatia inferior tamen viniculturam habet.

— — β laciniosa.

Ampelopsis quinquefolia Mich. (*Vitis hederacea* W. *Hedera quinquefolia* L.) Wilder Wein. Ad muros in hortis et ad domos culta.

Illecebrum verticillatum L. Knorpelblümchen. Im Unterlande, freq. Jul. — Sept. Annua.

Thesium pratense? Leinblatt. Bey Steinbach. Jul. Aug. Perenn.

Vinca minor L. Beerwintel, Sinngrün, Wintergrün. In sylvis et sepibus nemorosis. Majo. Perenn. Maxime sterilis, florentem quotannis am Schönbrunner Berg.

Digynia.

Cynanchum Vincetoxicum R. Br. (*Asclepias* L.) Schwalbenwurz. In montibus basaltarum. Maj. — Aug. Perenn.

Herniaria glabra L. Glattes Bruchkraut. In glareosis, arvis sterilibus. Jun. — Aug. Annua.

— *hirsuta* L. rauhes Bruchkraut. In agris editis arenosis bei Pribus, Hörniß. Julio. Perenn.

Chenopodium Bonus Henricus L. Guter, stolzer Heinrich. In pagis. Jun. — Aug.

— *hybridum* L. Schweinetodt. In Rietschen, Daubiß, Crebe, See. Jul. Aug. Annum.

- Chenopodium urbicum* L. Stadt-Gänsefuß.
In Crebe, Daubitz, Zittau, Ostrik. Jul.
Aug. Ann.
- *rubrum* L. Rother Gänse-Fuß, Mist-
melde. Daubitz, Rlix, Sorau. Jul. —
Sept. Ann.
- *murale* L. Gänsefuß-Melde. In Waruth,
Nieder-Gurke. Jul. Aug. Ann.
- *album* L. (viride Oett. et Auctor.) Ge-
meiner Gänse-Fuß, grüne Melde. In agris
oleraceis, hortis, ruderatis, vulgo. Jun.
— Sept. Ann.
- *ficifolium* Sm. Semel mihi observa-
tum, rarius videtur.
- *glaucum* L. Graugrüner Gänse-Fuß. In
runderatis, fimetis. Ostrik, Bernstadt,
Rothenburg, Dederwitz. Jul. — Sept.
Ann.
- *polyspermum* L. Fischmelde. In cul-
tis. Jul. — Sept. Ann.
- *olidum* Curt (Ch. Vulvaria L.) Stink-
melde, Bocksmelde. In urbibus, Görlitz,
Zittau, Baugen. Jul. Aug. Ann.
- Atriplex hortensis* L. Gärten-Melde. In hor-
tis inter olera.
- — α viridis
- — β lutea
- — γ sanguinea
- *nitens* Rehent. Glänzende Melde. Bei
Kausche. Jul. Aug. Annua.
- *patula* L. (hastata Oett.) Ausgebreitete
Melde. In ruderatis, humidis. Jul. —
Sept. Ann.
- *angustifolia* Sm. Schmalblättrige Mel-

de. In ruderatis siccioribus: Jul. —
Sept. Annua.

Beta vulgaris L. Mangold, rothe Rübe. Colitur.

— — α rubra

— — β pallida (B. Cicla Auctor.)

Ulmus campestris L. Rüster. Ulme. Ad pagos rarius. Aprili. Arbor.

— — γ suberosa.

— effusa W. (octandra Schkuhr.) Langstielige Rüster. Ad pagos, frequentior. Mart. Apr. Arbor.

Cuscuta europaea L. Teufelszwirn, Flachsseide. In salicetis, in urtica dioica vel aliis plantis habitans. Jul. — Sept. Annua.

— Epithymum Sm. Quendelwolle, Thymseide. In graminosis, ericetis, parasitica Jul. Aug. Annua.

(Annot: *Cuscuta Epilinum* Weihe, secundum Mertens et Koch in Lusatia habitans, observationes plures desiderat.)

Gentiana asclepiadea L. Berg-Enzian. In monte Tafelsichte. Aug. Sept. Perenn.

— *Pneumonanthe* L. Lungen-Enzian. Bei Preuschwitz, Kreckwitz. Aug. Sept. Perenn.

— *campestris* L. Feld-Enzian. Bei Herrnhut, auch an der Weinleche. Aug. Sept. Annua.

— *germanica* W. (amarella Hfm.) Bei Lauban. Schönwald. Aug. Sept. Annua.

Laserpitium pruthenium L. Läserkraut. In

nemoribus et in pratis fertilioribus.
Jul. Aug. Perenn.

Daucus Carota L. Möhre, gelbe Rübe. In
pratis, pascuis. Jul. Aug. Biennis.

— — β sativa L. Culta.

Torilis Anthriscus Gmel. (*Tordylium* L.)
Klettenerbel. Ad sepes in dumetis freq.
Jul. Aug. Biennis.

Coriandrum sativum L. Koriander. In cul-
tis hinc inde quasi sponte. Jun. Jul.
Ann.

Heracleum Sphondylium L. Bärentau. Heil-
kraut. In pratis, nemoribus. Jul. Aug.
Perenn.

Pastinaca sativa L. Pasternack. In pratis, ad
sepes, vias. Jul. Aug. Ann. et biennis.

Anethum graveolens L. Dill. In cultis,
quasi sponte. Jun. Jul. Ann.

Peucedanum palustre Mönch. (*Selinum* L.)
Sumpf-Silge. Ad rivulos, in dumetis
paludosis. Jul. Aug. Perenn.

— *Oreoselinum* Mönch. (*Athamanta* L.)
Wielgut, Grundheil. Um Görlitz, Bautzen,
Gutten, Niesky, Pribitz. Jul. Aug. Pe-
renn.

Imperatoria Ostruthium L. Meisterwurz.
Messersdorf, Schwarzbach. Jul. Aug.
Perenn.

Archangelica officinalis Hoffm. (*Angelica*
Archangelica L.) Angelik, Engelwurz.
In pagis hinc inde indigena facta. Jul.
Aug. Bienn.

Angelica sylvestris L. Wilder Angelik. In
pratis, sylvaticis humidis ad ripas freq.
Jul. Aug. Perenn.

- Selinum* Carvifolia L. Koffenichel. Kümmel-
Silge. In dumetis, pratis nemorosis
freq. Jul. Aug. Perenn.
- Levisticum* officinale Koch (Ligustic. Levi-
sticum L.) Liebstöckel. In pomariis,
pagos ad domos. Jul. Aug. Perenn.
- Meum* athamanticum Jacq. (*Aethusa meum* L.)
Bärwurzel. Bei Friedersdorf a. d. Spree.
Jun. Perenne.
- Seseli* Hippomarathrum L. Pferde-Dill.
Bei Reibersdorf. Jul. Aug. Perenn.
- *annuum* L. (montanum Oett.) Sesel.
Bei Gutte, Dubraute, Jauernitz, Schönau,
Nieda, Nieder-Gurke. Aug. Bienn.
- Oenanthe* fistulosa L. Wasser-Rebendolde. Bei
den Großhennersdorfer Teichen, olim apud
Rietschen. Jun. Jul. Perenn.
- *Phellandrium* Lam. (*Phellandr. aquat.*
L.) Wasserfenchel. In aquis vulgo. Jul.
Aug. Perenn.
- Aethusa* Cynapium L. Gleise, Hundspetersilge.
In hortis oleraceis. Jul. Aug. Annu.
- Foeniculum* vulgare Gärtn. (*Anethum Foeni-*
culum L.) Fenchel. Culta. Jun. Jul.
Perenn.
- Bupleurum* falcatum L. Hasenohr. Bei Nie-
da, Hörnitz. Jun. Jul. Perenn.
- Sium* latifolium L. Wasser-Merk. Um Riets-
schen, Neuhammer, Teiche, Spreewald bei
Burg. Jul. Aug. Perenn.
- Berula* angustifolia M. et K. (*Sium angu-*
stifol. L.) Berle, Merk. Bei Dautzen,
Kleinwelke, Weiche. Jul. Aug. Perenn.
- Pimpinella* magna L. Große Bibernell. Bei

Marflissa, Hirschfelde, Eschocha, Herrnhut,
Bauzen. Jun. — Sept. Perenn.

Pimpinella magna β pianatifida

— — γ laciniata

— — δ dissecta.

— *Saxifraga* L. Kleine Bibernell. In pra-
tis, pascuis, vulgo. Jun. — Aug. Pe-
renn.

α minor Spr.

β major Wallr.

Carum Carvi L. Karbe, Wiesen-Rümmel. In
pratis. Maj. — Jul. Bienn.

Aegopodium Podagraria L. Geißfuß, Giersch.
Ad sepes, in dumetis, frequens, in hor-
tis planta molesta. Tota aestate. Pe-
renn.

Critamus agrestis Bess. (*Sium Falcaria* L.)
Sicheldobold, Sichelmoöhre. Um Zittau,
Bauzen. Jul. Aug. Perenn.

Petroselinum sativum Hoffm. (*Apium Petro-
selin.* L.) Petersilge. Culta. Jun. Jul.
Bienn.

— — β rapaceum.

— — γ crispum.

Apium graveolens L. Sellerie. Nobis non
indigena, frequens colitur. Jul. —
Sept. Perenn.

Cicuta virosa L. Wasser-Schierling. Draasendorf,
Ullersdorf, Rietschen, Crebe, Spreewald.
Jul. Aug. Perenn.

Chaerophyllum aromaticum L. Gewürzhaster
Kälbertropf. In dumetis, pratis sylv-
ticis. Jul. Aug. Perenn.

— *hirsutum* L. Rauher Bergferbel. In
nemorosis herbidis, ad rivulos. Dybin-

- thal, Petersbach, Löbauer Wasser, Göda,
 Messersdorf. Jul. Aug. Perenn.
- Chaerophyllum bulbosum* L. Knolliger Käl-
 berkropf. In dumetis an der oberen
 Neiße, Baruth, Nieder-Surke. Jun. Jul.
 Bienn.
- *temulum* L. Laumel-Kerbel. In dume-
 tis pagorum. Jun. — Aug. Bienn.
- Anthriscus sylvestris* Hoffm. (Chaerophyl-
 lum L.) Wilder Kerbel. In sepibus,
 ruderatis, pratis fertilioribus vulgo.
 Jun. — Aug. Perenn.
- *Cerifolium* Hoffm. (Scandix L.) Gar-
 ten-Kerbel. Ad sepes, in cultis hinc
 inde quasi sponte. Jun. — Aug. Ann.
- *vulgaris* Pers. (Scandix Anthriscus L.)
 Klettenkerbel. Baugen, Gutte, Crebe.
 Jun. Jul. Ann.
- Myrrhis odorata* Scop. (Scandix L.) Anis-
 kerbel. In pomariis, hinc inde. Jun.
 Jul. Perenn.
- Conium maculatum* L. Schierling. Großhen-
 nersdorf, Seitendorf, Niesky, Lübbenau.
 Jul. Aug. Ann. et bienn.
- Astrantia major* L. Schwarze Meisterwurz.
 Waltersdorf, Ruppertsdorf, Burkersdorf,
 Schönau, Lürchau. Jun. — Aug. Perenn.
- Sanicula europaea* L. Sanicel. In sylvati-
 cis montosis. Maj. Jun. Perenn.
- Eryngium campestre* L. Mannstreu. Olim
 ad Baruth semel observatum; ultra ter-
 minos ad Stolpen vidi. Jun. Jul. Pe-
 renn.
- Hydrocotyle vulgaris* L. Wassernabel. Um

Niesky abunde, rarior bei Burkersdorf,
Bautzen. Jul. Aug. Perenn.

Trigynia.

Rhus Cotinus L. Perückenbaum } Culta in
— *typhinum* L. Hirschholben, Sumach } arboretis
Viburnum Lantana L. Wolliger Schneeball.

In arboretis cult. rarior.

— *Opulus* L. Wilder Schneeball. Wasser-
holder. In nemorosis humidis. Maj.
Jun. Frutex.

— — β roseum W. Culta.

Sambucus Ebulus L. Attich. Bei Ostritz. Jun.
— Aug. Perenn.

— *nigra* L. Holunder, Flieder. In sepibus
frequens. Jun. Jul. Frutex.

— *racemosa* L. Traubenholunder, rother
Holder. In nemorosis et in montanis.
Apr. Maj. Frutex.

Staphylea pinnata L. Pimpernuß, Blasennuß.
In arboretis culta.

Corrigiola littoralis L. Strändling. In areno-
sis inundatis am unteren Meißufer, freq.
Aug. Sept. Annua.

Tetragynia.

Parnassia palustris L. Einblatt, weiße Leber-
blume. In pratis paludosis vulgare.
Aug. Sept. Perenn.

Pentagynia.

Armeria vulgaris W. (Stalice Arm. L.) Gras-
nelke, Meergras. In versuris arenosis,
frequentissime in den untern Meißgegen-
den. Jun. — Sept. Perenn.

Armeria vulgaris α elongata.

— — β maritima, in hortis culta.

Linum usitatissimum L. Flachß, Lein. Colitur.

— catharticum L. Purgir-Lein. In pratis, praesertim paludosis, freq. Jul. Aug. Ann.

Drosera rotundifolia L. Großer Sonnentbau. In paludibus ericetorum. Jul. Aug. Perenn.

— intermedia Hayne (longifolia L.) Kleiner Sonnentbau. In turfosis um Niesky copios. Jul. Aug. Perenn.

Polygynia.

Myosurus minimus L. Mäufeschwanz, Mäusegras. In arvis, ad vias. Apr. — Junio. Annua.

Hexandria.

Monogynia:

Galanthus nivalis L. Schneetropfen. In pomariis hinc inde, Kennersdorf, Messersdorf. Mart. Apr. Perenn.

Leucojum vernum L. Schneeglöckchen. In pratis humidis, et pomariis. Radmeritz, Ostritz, Zauchritz, Herwigsdorf, Johnsdorf, Herrnhut. Mart. Apr. Perenn.

— — Variat scapo bifloro.

Narcissus Pseudo-Narcissus L. Märzbecher, gelbe Narzisse. In hortis gramineis et pomariis. cult.

— — Variat flore pleno.

— poeticus L. Weiße Narzisse. Cum priore.

Allium ursinum L. Bären-Lauch, Wald-Knoblauch. In nemorosis montosis rarius.

Kausche, Schönbrunner Berg, Haynewalde.
Maj. Jun. Perenn.

Allium *Victorialis* L. Langer Allermannshar-
nisch. In pomariis pagorum am Fried-
ländischen Gebirge culta.

— *Porrum* L. Porrey, Winter-Lauch. In
oleraceis culta.

— *sativum* L. Knoblauch, Colitur.

— *oleraceum* L. Wilder Lauch. In agris
lutosus saxosis hinc inde im Oberlande,
Jul. Aug. Perenn.

— — β *complanatum* Fries (*carina-*
tum Auct.) In montosis.

— *vineale* L. Hundslauch, Ackerknoblauch.
In arvis, rarius. Jun. Jul. Perenn.

— *sphaerocephalum* L. Rundköpfiger
Lauch. In arvis bei Herwigsdorf, Wit-
gendorf, Großhenndorf. Jul. Aug.
Perenn.

— *ascalonicum* L. Schalotte. In olera-
ceis culta.

— *schoenoprasum* L. Schnittlauch. Culta.

— *fistulosum* L. Winterzwiebel, Schlot-
ten. Culta.

— *Cepa* L. Sommerzwiebel, Follen, Zibollen.
Culta.

Lilium *Martagon* L. Türkenbund, Goldwurz.
Sohlander und Jauernicker Berg, Kausche,
Hörnitz. Jun. Perenn.

Streptopus *amplexifolius* Pers. (*Uvularia*
L.) Zapsentraut. Am Friedländischen
Grenzgebirge. Jun. Jul. Perenn.

Ornithogalum *stenopetalum* Fries (*luteum*
Oett.) gelbe Vogelmilch, gelbe Sternblu-

me. In agris, sepibus, pratis, dumetis.
Apr. Maj. Perenn.

Ornithogalum arvense Pers. (villosum M. B.)
Zottige Vogelmilch. Um Görlitz. Apr.
Perenn.

— *spathaceum* Hayne Milchstern. Um
Kleinwelke. Apr. Maj. Perenn.

— *minimum* L. (O. Sternbergii Hoppe)
kleiner Milchstern. Um Kleinwelke. Apr.
Perenn.

— *sylvaticum* Pers. (luteum L.) Gelber
Milchstern. In pratis, pomariis, hinc
inde. Mart. Apr. Perenn.

— *umbellatum* L. Weiße Vogelmilch. In
agris. Majo. Perenn.

— *nutans* L. Wasser-Hyazinth. In poma-
riis rarior. Apr. Maj. Perenn.

Scilla amoena L. Stern-Hyazinthe. E. flora-
liis in pomariis emigrata. Maj. Perenn.

Anthericum ramosum L. Zaunblume. Niesky,
Tränke, Sähnitz, Schnellfürthel. Rarior.
Jun. Jul. Perenn.

Asparagus officinalis L. Spargel. Culta.

Convallaria majalis L. Maiblume, Zschaucke.
In nemorosis et montosis. Majo. Per-
enn.

— *verticillata* L. Quirl-Maiblume. Weiß-
wurzmännlein. Bei Meffersdorf, Seiten-
dorf, Dybin, Lausche, Johnsdorf. Junio.
Perenn.

— *Polygonatum* L. Klein Weißwurzmänn-
lein. In montosis nemorosis. Maj.
Jun. Perenn.

— *multiflora* L. Groß Weißwurzmännlein.
In nemorosis humidis. Maj. Jun. Perenn.

Muscari comosum W. (Hyacinthus L.) Acker-
Hyacinth. Ad latera montium, rarissi-
me. Majo. Perenn.

— *racemosum* W. (Hyacinthus L.) Klei-
ner Traubenhyacinth. In pomariis. Maj.
Perenn.

Acorus Calamus L. Ralmus. In lacubus, pa-
ludibus. Jun. Jul. Perenn.

Juncus conglomeratus L. Knopfbinsen, Sen-
den. Ad fossas, lacus, paludes. Jun.
Jul. Perenn.

— — β Var. *effusus*.

— *effusus* L. Flatterbinsen. Cum priore
multo frequentior. Jun. Jul. Perenn.

— — β *compactus*.

— *glaucus* Ehrh. (inflexus Leers.) Meer-
grüne Simse. Im Oberlande. Jun. Jul.
Perenn.

— *filiformis* L. Faden-Simse. In pratis
paludosis abunde. Jun. Jul. Perenn.

— *squarrosus* L. Sparrige Simse. In
sterilibus ericetis paludosis vel siccis.
Jun. Jul. Perenn.

— *compressus* Jacq. (bulbosus L.) Weg-
Binse. In pascuis humidis et ad vias.
Jul. Aug. Perenn.

— *Tenageja* Ehrh. Zarte Simse. In eri-
cetis arenosis inundatis, Niesky, Königs-
warthe. Jun. — Aug. Ann.

— *bufonius* L. Krötenbinsen. In inunda-
tis, agris humidis, ubique. Jun. —
Sept. Ann.

— *capitatus* Weig. Kopf-Simse. In agris
arenosis humidis, um Niesky. Jul. Aug.
Ann.

- Juncus fusco-ater* Schreb. Schwarzbraune
Simsse. In arenosis udis, hinc inde.
Jul. Aug. Perenn.
- *lampocarpus* Ehrh. (obtusiflor. Oett.)
Glieder-Senden. In paludibus, fossis,
vulgaris. Jul. — Sept. Perenn.
- — Varietas vivipara.
- *acutiflorus* Ehrh. Glieder-Binsen. In
pratis paludosis, sylvaticis, copiose.
Jul. Aug. Perenn.
- — β multiflorus Weihe.
- — γ pallidus.
- *uliginosus* Roth. (supinus Mönch, sub-
verticillatus W.) Schlamm-Simsse. In
uliginosis im Heidefeld, nihil vulgatus.
Jun. — Aug. Perenn.
- — α erectus Krock.
- — β repens (uliginosus a Meyer Sy-
nops. Junc.)
- — γ fluitans.
- Luzula vernalis* De. (*Juncus pilosus* L.) haa-
rige oder frühe Binsen, Buschgras. In
sylvis umbrosis. Apr. Maj. Perenn.
- *maxima* De. (Junc. pilos. β Oett.) Gro-
ße Hain-Simsse. Bei Meßersdorf. Maj.
Jul. Perenn.
- *albida* De. (*Juncus* L.) Weißliche Bin-
sen. In nemorosis montanis etiam eri-
cetis. Jun. — Aug. Perenn.
- — β cuprea.
- *campestris* De. (*Juncus* L.) Feldbin-
den, Hasenbrot. In pascuis, nemoribus,
vulgo. Mart. — Jul. Perenn.
- — β erecta Pers. (multiflora)
- — γ pallescens.

Luzula campestris δ congesta.

Berberis vulgaris L. Sauerdorn, Berberitze.
In nemorosis, ad sepes; Reißufer bei
Görlitz, Spreeufer bei Dehne. Maj. Jun.
Frutex.

Peplis Portula L. Aſterquendel. In inundatis
et aquosis ubique. Jun. — Sept. Ann.

Trigynia.

Rumex Patientia L. Englischer Spinat. In
pratis, ad fossas bei Hörnitz; in hortis
cultis. Jul. Aug. Perenn.

— *crispus* L. Schsenzunge, krauser Ampfer.
In pratis, ad fossas, in ruderalis. Jun.
Jul. Perenn.

— *pratensis* M. et K. Wiesen-Ampfer.
Bei Ullersdorf und im Oberlande. Jun.
Jul. Perenn.

— *obtusifolius* L. Grindwurz. In pra-
tis humidis, sepibus umbrosis, rudera-
tis. Jul. Aug. Perenn.

— (Nemolapathum).

— *conglomeratus* Schreb. Gefnälter
Ampfer. In fossis, ruderalis. Jul. Aug.
Perenn.

— *palustris* Sm. (maritimus Hfm.) Grün-
gelber Ampfer. In humidis, palustribus,
rarius; Drausendorf, Hulsche. Jul. Aug.
Perenn.

— *Hydrolapathum* Huds. Riesen-Am-
pfer. Ad ripas. Bei See, Rietschen,
am Schöpf, an der Reißer. Jul. Aug.
Perenn.

— *aquaticus* L. Wasser-Ampfer. Ad ri-
pas an der Reißer, bei Weissenberg, Hör-
nitz, Haynewalde. Jun. Jul. Perenn.

Rumex Acetosa L. Sauer-Ampfer. In pratis vulgo. Maj. Jun. Perenn.

— *Acetosella* L. Schaaf-Ampfer, kleiner Ampfer. In arvis, ad vias, copiose, saepius agros incultos obtegit colore purpureo.

— — α major.

— — β minor.

— — γ decumbens.

Veratrum album L. β Lobelianum Bernh. Weiße Nießwurz. Tafelfichte und Schwarzbacher Thal. Jul. Aug. Perenn.

Scheuchzeria palustris L. Traubenbinsen. Bei Wehrau, Tiefenfurth. Jun. Jul. Perenn.

Triglochin palustre L. Salzbinsen, Dreizack. Bei Diehsa, Dedernitz, Kuppersdorf, Heuscheuer. Jun. Jul. Perenn.

Polygynia.

Alisma Plantago L. Wasserwegerich, Froschlöffel. In aquis ubique. Jun. — Aug. Perenn.

— — β lanceolata.

— *natans* L. Schwimmenber Froschlöffel. Bei Linda, Heidersdorf, Moys. Jul. Aug. Perenn.

Heptandria.

Monogynia.

Trientalis europaea L. Sternblümchen, Schirmkraut. Meßersdorf, Dybin, Lausche, Niesky, Melauue, Radischer und Königshayner Berge. Jun. Jul. Perenn.

Ludit petalis et staminibus 5, 6, 9.

Aesculus Hippocastanum L. Kofkastanie. In ambulacris, ad domos plantata.

*Octandria:**Monogynia.*

- Epilobium angustifolium* L. Weiderichsroslein. In sylvis caeduis. Jun. — Aug. Perenn.
- *hirsutum* L. (grandiflor. Roth.) Bachweiderich. Bei Eckartsberge, Ruppertsdorf. Jul. Aug. Perenn.
- *pubescens* Roth. (parviflor. Sm.) weicher Weiderich. Rosenthal bei Hirschfelde, Großhennersdorf. Jul. Aug. Perenn.
- *montanum* L. Berg-Weiderich, Unholdenfraut. In sylvaticis. Jun. — Aug. Perenn.
- *roseum* Roth. Blaßes Unholdenfraut. Ad fossas, in cultis, ruderatis. Jun. — Aug. Perenn.
- *tetragonum* L. Vierkantiger Weiderich. In paludosis, ad fossas. Nießky. Jul. — Aug. Perenn.
- *palustre* L. Sumpf-Weiderich. In uliginosis. Jul. Aug. Perenn.
- Oenothera biennis* L. Nachtkerze, gelbe Kapuzel. In cultis, ruderatis. Jun. — Aug. Bienn.
- Acer Pseudoplatanus* L. Spitz-Ahorn. In sylvis montanis. Apr. Maj. Arbor.
- *platanoides* L. Gemeiner Ahorn, Eshue. Cum priore. Majo. Arbor.
- (campestre L. Feldahorn) Görlitzer Heide. N. Lauf. Magaz. 2. Bd. 1. Heft.
- Oxycoccus palustris* Pers. (Vaccinium Oxycocc. L.) Moosbeere. In ericetis turfo- sis im Unterlande. Maj. — Jul. Perenn.

- Erica Tetralix* L. Sumpf-Heide. Um Riesth,
Klein-Radisch, Rosel, Königswartha, Schnell-
fürthel. Jul. Aug. Perenn.
— *vulgaris* L. (*Calluna* vulg. Salisb.) Hei-
defraut. Nimium. Aug. Sept. Perenn.
— — β flore albo., hinc inde rarius.
Daphne Mezereum L. Seidelbast, Kellerhals.
In montosis nemorosis. Mart. Apr. Frutex.

Tryginia.

- Polygonum Bistorta* L. Ratterwurz. In pra-
tis im Oberlande. Maj. — Jul. Perenn.
— *amphibicum* L. Wasser-Knöterich. In
aquis. Jun. Jul. Perenn.
— — α natans
— — β aquaticum
— — γ terrestre.
— *lapathifolium* L. Umpfer = Knöterich.
In arvis, ruderatis. Jul. — Sept. Ann.
— — Var. *incanum* Schm.
— *Persicaria* L. Floh-Knöterich. In agris,
runderatis. Jul. Aug. Ann.
— *minus* Ait. Kleiner Knöterich. In fossis
et paludosis im Heideland copiose. Jul.
— Oct. Ann.
— — Variat caule stricto vel diffuso, fo-
liis latioribus et angustissimis.
— *dubium* Braun. Ad fossas hinc inde.
Jun. Jul.
— *Hydropiper* L. Wasserpfeffer. In fossis
ad ripas aquarum stagnantium, frequens
Jul. Sept. Perenn.
— — β densiflorum.
— — γ obtusifolium.
— — δ angustifolium.

Polygonum aviculare L. Wegetritt, Vogel-Knöterich. Ad vias, in agris, locis sterilibus vulgatissime. Jun. — Oct. Ann.

Variat caule prostrato, foliis latioribus et angustioribus, caule stricto, foliis angustissimis.

- *Fagopyrum* L. Heidekorn, Buchweizen, Colitur.
- *Convolvulus* L. Buchwinde. In agris frequens. Jun. — Aug. Ann.
- *dumetorum* L. Vogelzunge. Ad sepes, in cultis. Jul. — Aug. Ann.

Tetragynia.

Paris quadrifolia L. Einbeere, Wolfsbeere. Herrnbut, Lausche, Jauernick, Diehsa. Maj. Jun. Perenn.

— — Variat foliis quinis, senis.

Adoxa moschatellina L. Bisamkraut. In nemorosis, umbrosis, Cunnersdorf bei Görlitz, Lauske, Stromberg, Herrnbut. Apr. Maj. Perenn.

Elatine triandra Schk. Wasserpfeffer. Bei Niesky. Jul. Aug. Ann.

— *Hydropiper* L. Wasserpfeffer. Bei Creba, Görlitz. Aug. Sept. Ann.

— *Alsinastrum* L. Tännel. Bei Niedersseifersdorf, Preititz, Pliskowitz. Jul. Aug. Ann.

Enneandria.

Hexagynia.

Butomus umbellatus L. Binsenschwertel, Blumenbinsen. Bei Nechern, Marienthal, Drausendorf, Reibersdorf. Jun. Jul. Perenn.

(Die Fortsetzung folgt.)

~~~~~

Burkhardt.

Jung. Juss. 2.5. 61 Juss.